XI congresso nazionale

simeu

ROMA 24-26 MAGGIO 2018

NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE URGENZE CLINICHE

Dr.ssa Valentina Masciangelo

Dr.ssa Veronica Diurni

**OSPEDALE SANDRO PERTINI - ROMA
UOC PRONTO SOCCORSO-MEDICINA D'URGENZA**

Direttore Dr. Francesco Rocco Pugliese

Data e ora di ingresso 08/04/2018 08:46 Data e ora di dimissione 09/04/2018 09:35

ENTRATA

Modalità di Invio **Amb. 118**

Inviato da **Trasp. Urgente**

Codice mezzo **686**

Codice trasporto **1014950C**

Note

1) 037 condotta a mezzo ambulanza paz in stato di agitazione accompagnata dalla municipale con richiesta di tso somministrate due fl di talofen im dalla guardia medica

CONDIZIONI ALL'INGRESSO

Triage **1 Molto critico - Rosso**

Problemi principali **Altri sintomi o disturbi**

Ambulatorio **Medico**

Durata sintomi **meno di 3 ore**

STORICO URGENZA

Data e ora

Operatore

Urgenza

08/04/2018 08:49

Rosso

ANAMNESI PS

XI congresso nazionale

simeu

ROMA 24-26 MAGGIO 2018

Anamnesi ed Esame obiettivo in PS

ANAMNESI

Richiesto intervento del 118 perché la paziente vagava per la città in stato d'agitazione psicomotoria.

Non precedenti accessi in PS

ESAME OBIETTIVO ALL'INGRESSO

Paziente molto agitata, con alito alcoolico, disorientata nel tempo con eloquio concitato, ideazione disorganizzata con disforia e forte oppositività al colloquio, alla visita, agli accertamenti ed alle cure. Atteggiamento di sfida.

Presenza allucinazioni cenestopatiche.

Esami ematochimici in PS

Nosologico: 2018017568

Unità: UOC Biochimica clinica Tel.: 06 - 41433532

Esame	Esito	U.M.	Valori Riferimento	Metodica
EMATOLOGIA E COAGULAZIONE				
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO				
Globuli bianchi	10,07	x10 ³ /µL	4,00 - 12,00	Citometria a flusso
Globuli rossi	4,88	x10 ⁶ /µL	3,50 - 5,60	
Emoglobina	10,5	g/dl	11,0 - 18,0	
Ematocrito	31,5	%	32,0 - 48,0	
Volume globulare medio (MCV)	64,5	fL	79,0 - 101,0	
Contenuto globulare medio Hb (MCH)	21,5	pg	26,0 - 35,0	
Concentrazione Hb globulare media (MCHC)	33,3	g/dl	31,0 - 37,0	
Piastrine	289	x10 ³ /µL	150 - 450	
Ampiezza distribuzione eritrociti (RDW-SD)	37,5	fL	37,0 - 54,0	
Ampiezza distribuzione eritrociti (RDW)	17,0	%	11,5 - 16,0	
Ampiezza distribuzione piastrine (PDW)	21,1	%	9,0 - 17,0	
Volume piastrinico medio (MPV)	12,2	fL	9,0 - 13,0	
Percentuale grandi piastrine (P-LCR)	41,6	%	13,0 - 43,0	
Neutrofili	70,3	%	37,0 - 75,0	
Linfociti	23,0	%	12,0 - 50,0	
Monociti	6,1	%	0,0 - 10,0	
Eosinofili	0,4	%	0,0 - 7,0	
Basofili	0,2	%	0,0 - 1,5	
Neutrofili	7,08	x10 ³ /µL	2,00 - 8,00	
Linfociti	2,32	x10 ³ /µL	1,00 - 4,50	
Monociti	0,61	x10 ³ /µL	0,00 - 1,00	
Eosinofili	0,04	x10 ³ /µL	0,00 - 0,90	
Basofili	0,02	x10 ³ /µL	0,00 - 0,30	

Urea	20	mg/dl	15 - 43	Ureasi
Creatinina	0,7	mg/dl	0,52 - 1,04	Enzimatica
eGFR (filtrazione glomerulare calcolata)	104	ml/min	cut-off: 60 ml/min	formula MDRD
Glucosio	81	mg/dl	74 - 106	Colorimetrica
Sodio	138	mEq/L	137 - 145	ISE
Potassio	3,6	mEq/L	3,6 - 5,0	ISE
AST - aspartato aminotransferasi	53	* U/L	14 - 36	Enzimatica
ALT - alanina aminotransferasi	48	U/L	9 - 52	Enzimatica
Lattato deidrogenasi	1 027	* U/L	313 - 618	Enzimatica
Creatinichinasi	2 617	* U/L	30 - 135	Enzimatica
GGT - gammaglutamil transpeptidasi	14	U/L	12 - 58	Enzimatica
Bilirubina totale	1,5	* mg/dl	0,20 - 1,30	Colorimetrica
Bilirubina diretta	0,5	* mg/dl	0,0 - 0,3	Colorimetrica
Lipasi	60	U/L	23 - 300	Enzimatica
Alfa amilasi	<30	U/L	30 - 110	Enzimatica
Proteina C reattiva	1,3	* mg/dl	0,00 - 0,50	Turbidimetria

CHIMICA E IMMUNOCHIMICA

Beta HCG (test quantitativo)	<2,39	mUI/ml	Non gravidanza < 5 In gravidanza (settimane): 3-4: 6 - 750 5-7: 217 - 163.000 8-13: 32.000 - 210.000 14-15: 13.950 - 70.970 16-17: 9.040 - 55.800 18-41: 8.000 - 58.000	CLIA
------------------------------	-------	--------	--	------

CHIMICA SPECIALE E TOSSICOLOGIA

Etanolo	32	mg/dl	0,0 - 50,0	EMIT
ASSESS - test immunochimico di screening. Secondo l'intervallo di misura in uso presso questo laboratorio (ai sensi del DL n.285/1992) il limite per la guida corrisponde a 50				

Esami tossicologici in PS

Esame	Esito	U.M.	Valori Riferimento	Metodica
CHIMICA SPECIALE E TOSSICOLOGIA				
Oppiacei (cataboliti urinari)	Assenti		Assenti CUT-OFF 300 ng/ml Test immunochimico di screening per esclusivo uso clinico (accettazione del campione senza catena di custodia).	EMIT
Cocaina (cataboliti urinari)	Assenti		Assenti CUT-OFF 300 ng/ml Test immunochimico di screening per esclusivo uso clinico (accettazione del campione senza catena di custodia).	EMIT
Cannabinoidi (cataboliti urinari)	PRESENTI		Assenti CUT-OFF 50 ng/ml Test immunochimico di screening per esclusivo uso clinico (accettazione del campione senza catena di custodia).	EMIT
Amfetamine (cataboliti urinari)	Assenti		Assenti CUT-OFF 500 ng/ml Test immunochimico di screening per esclusivo uso clinico (accettazione del campione senza catena di custodia).	EMIT
Benzodiazepine (cataboliti urinari)	PRESENTI		Assenti Test immunochimico di screening per esclusivo uso clinico (accettazione del campione senza catena di custodia).	EMIT

Intervallo di tempo investigabile		
	Sangue (ore)	Urine (giorni)
Eroina (morfina)	6	2
Cocaina (beg)	2 (24)	2-4
Cannabis	4-8	Sporadico fino a 15 Cronico oltre 30
Benzodiazepine	6-36	Uso terapeutico 3 giorni Uso cronico 30-45
Metadone	24	4
Amfetamine	12-24	1-4

Nosologico: 2018017568				
Esame	Esito	U.M.	Valori Riferimento	Metodica
Metadone (cataboliti urinari)	Assenti		Assenti CUT-OFF 300 ng/ml Test immunochimico di screening per esclusivo uso clinico (accettazione del campione senza catena di custodia).	EMIT

Unità: UOC Biochimica clinica Tel.: 06 - 41433532

Esame	Esito	U.M.	Valori Riferimento	Metodica
CHIMICA SPECIALE E TOSSICOLOGIA				
Oppiacei (metaboliti urinari)	Assenti		Assenti CUT-OFF 300 ng/ml Test immunochimico di screening per uso clinico (al campione è stata applicata la catena di custodia).	Enzimatica

Ragionamento Clinico

1. DISSOCIAZIONE PRIMARIA O SECONDARIA?
2. PERCHÉ RABDOMIOLISI?
3. QUADRO CLINICO COMPATIBILE CON LA SOLA ASSUNZIONE DI BDZ E CANNABINOIDI?

Assunzione di nuova sostanza psicoattiva?

Quale?

NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE (NSP)

Definizione

UNODC 2015 (United Nations Office for Drugs and Crime): **ogni sostanza con proprietà psicoattiva non ancora classificata nè controllata dalle convenzioni dell'ONU** (la *Single Convention on Narcotic Drugs* del 1961, la *Convention on Psychotropic Substances* del 1971 e la *United Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* del 1988), **indipendentemente dal momento in cui è stata sintetizzata o da quanto tempo venga utilizzata per altri scopi, anche leciti.**

L'EMCDDA 2015 (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction): **“ogni narcotico o sostanza psicotropa, in forma pura o in preparazione, che non sia controllata dalle convenzioni sulle droghe delle Nazioni Unite, ma che possa rappresentare una grave minaccia alla salute umana al pari delle sostanze che sono state già elencate da tali convenzioni”.**

NPS – Scope of the problem

- 541 NPS since 2008 reported to UNODC (Jan 2015)
- 95 countries and territories have reported NPS

Drammatico aumento delle NSP notificate (UNODC, 2015)

-da 126 a **450** tra il 2009 ed il 2014.

-**541** sostanze, in 95 paesi, nel 2014.

-più di **560** NSP, in oltre 96 paesi, al 1 febbraio 2016.

NSP: UNA SFIDA PER IL MEDICO D'URGENZA

Conoscenza limitata dei vari e mutevoli aspetti
delle nuove droghe

- ◆ **Conoscenza tecnica** (quali sono e come agiscono)
- ◆ **Conoscenza culturale** (chi e come le assume)
- ◆ **Conoscenza clinica** (come gestire l'abuso acuto e cronico)

PRINCIPALI GRUPPI di NSP

- Cannabinoidi sintetici
- Catinoni sintetici
- Fenetilamine
- Triptamine
- Piperazine
- “Herbal highs”
- Ketamine
- Sostanze PCP (fenciclidino)-simili
- Aminoindani e un gruppo miscelaneo composto dalle NSP che per caratteristiche chimiche/farmacologiche non rientrano in nessuna delle categorie sopraelencate (es. DMMA).

Oltre alle sopracitate categorie, si annoverano anche:

- i “nuovi stimolanti” (es. 4,4-dimethylaminorex/4,4-DMAR; metiopropamina/MPA, etc),
 - gli “oppioidi/opiacei di sintesi” (es. AH-7921, MT-45, etc)
- i “sostituti sintetici della cocaina” (es. RTI-111, RTI-121, RTI-126, etc),
- gli agonisti del recettore GABA (es. GHB, GBL, baclofene, fenibut, etc.),
 - i farmaci di prescrizione (es. olanzapina, quetiapina, etc) e
 - i performance e image-enhancing drugs (PIEDs) (Schifano, 2015).

GOGAINE
RESEARCH CHEMICAL POWDER

X 18 NOT FOR HUMAN CONSUMPTION

BENZO FURY
RESEARCH CHEMICAL PELLETS

X 18 NOT FOR HUMAN CONSUMPTION

Annihilation
IONEXISTENCE

MXE
RESEARCH CHEMICAL PELLETS
METHOXYETAMINE

X 18 NOT FOR HUMAN CONSUMPTION

AMT
RESEARCH CHEMICAL PELLETS

X 18 NOT FOR HUMAN CONSUMPTION

SPICE
an eighth

3.5g when packed

Chi sono i consumatori di NSP?

Dipende da dove sei e chi sei !

MARIJUANA
PHYSICAL EFFECTS

SYNTHETIC CANNABINOIDS
PHYSICAL EFFECTS

MARIJUANA
EFFECTS ON THE BRAIN

Paranoia
Anxiety
Depression
Slow reaction time
Distorted sense of time
Short-term memory loss
Feeling of relaxation
Strange feelings or "random" thinking

SYNTHETIC CANNABINOIDS
EFFECTS ON THE BRAIN

Paranoid delusions
Anxiety
Depression
Suicidal thoughts
Psychosis
Severe agitation
Inability to feel pain
Hallucinations
Total memory loss

Rispetto al consumo di cannabis, l'assunzione di CS risulta caratterizzata da:

- inizio più rapido dell'effetto
- durata più breve
- maggiori livelli di hangover
- più frequenti e intense allucinazioni visive, paranoia e discontrollo comportamentale (Papanti et al., 2013)

ANATOMY OF A METH USER

Extreme loss of appetite
Malnutrition
Anorexia

Extreme rise in body temperature, which can cause brain damage
Loss of vision
Tooth decay
Dry mouth
Permanent nerve damage

Self-inflicted wounds from removing hallucinatory 'crank bugs' / 'meth bites'
Sores take longer to heal

Breakdown of muscle tissue which may lead to kidney failure
Putrid body odor

Bone loss from mineral and vitamin deficiencies
Hair loss

Respiratory failure
Toxic vapors scorch or burn the exophagus and lungs
Crystals form in lungs
Chest pain
High blood pressure
Build-up of fluid in the lungs and brain
Liver damage
Kidney and lung disorders

METH RESPECTS NO ONE!

www.kci.org
©2008

Meth is different; it isn't going away.
Once it gets into your community, it stays.

SKIN

FACIAL MUSCULATURE AND FAT

TEETH AND GUMS

INCREASING ESTIMATED AGE

Methamphetamine Users

Combinazioni con altre sostanze allo scopo di intensificarne gli effetti o ridurre quelli indesiderati.

MDPV+ alcool, propanololo o ad altri beta-bloccanti per controbilanciarne la tachicardia; con il GHB/GBL come afrodisiaco, con il zopiclone per produrre allucinazioni visive; con il kratom/*Mitragyna speciosa*, con gli allucinogeni e con le amfetamine per potenziarne gli effetti psicostimolanti e le proprietà entactogene; con il pregabalin/omeprazolo/domperidone per alleviare i sintomi gastrici con le benzodiazepine e la cannabis per ridurre lo stato ansioso.

FENETILAMINE SINTETICHE

ECSTASY

HARMFUL EFFECTS

- BRAIN DAMAGE
- ADDICTION
- SEVERE ANXIETY
- PARANOIA
- DEPRESSION
- BLURRED VISION
- TEETH CLENCHING
- SWEATING
- CHILLS
- FAINING
- LUNG FAILURE
- INCREASES HEART RATE & BLOOD PRESSURE
- HEART FAILURE
- LIVER DAMAGE
- LOSS OF APPETITE
- VOMITING
- KIDNEY DAMAGE
- INCREASES BODY TEMPERATURE
- HEAT STROKE
- NAUSEA
- MUSCLE TENSION

- Psychological**
- Insomnia
 - Aggressive behavior
 - Paranoia
 - Incessant conversations
 - Decreased appetite
 - Increased alertness
 - Irritability
 - Slurred speech
 - Dizziness
 - Confusion
 - Hallucinations
 - Obsessive behaviors
 - Depression
 - Panic attacks

Adverse (negative) effects of Methamphetamine

-
- Systemic**
 - Hypothermia
 - Malnutrition
 - Impaired immune system
 - Circulatory**
 - High blood pressure
 - Vessel damage in brain
 - Clotting and stroke
 - Heart**
 - Chest pain
 - Rapid heart rate
 - Heart attack
 - Liver**
 - Damage
 - Eyes**
 - Dilated pupils
 - Mouth**
 - Grinding of teeth
 - Skin**
 - Sweating
 - Numbness
 - Respiratory**
 - Shortness of breath
 - Muscular**
 - Jerky movements
 - Increased activity
 - Convulsions
 - Loss of coordination
 - Kidneys**
 - Damage

COMPLICANZE POTENZIALMENTE FATALI NSP

- EPATITE TOSSICA/INSUFFICIENZA EPATICA
- RABDOMIOLISI COMPLICATA DA INSUFFICIENZA RENALE ACUTA, SINDROME COMPARTIMENTALE, CID
- COMA
- STROKE
- SINDROME SEROTONINERGICA
- IPERTERMIA
- PSICOSI ACUTE
- ARITMIE SEVERE
- IMA

Meccanismi fisiopatologici della sindrome serotoninergica

(1) Un'aumentata disponibilità di triptofano determina un incremento proporzionale della formazione di serotonina (5-HT). (2) Aumento del rilascio di serotonina (es. anfetamine, tramadolo, meperidina, venlafaxina). (3) Inibizione del metabolismo della serotonina (es. IMAO) e aumento della concentrazione pre-sinaptica di serotonina. (4) Alterazione del trasporto della serotonina nei neuroni pre-sinaptici da parte di agenti bloccanti il *reuptake* (es. inibitori selettivi del *reuptake della serotonina*, *antidepressivi triciclici*) ed aumento conseguente della concentrazione sinaptica di serotonina. (5) Stimolazione dei recettori 5-HT post-sinaptici da parte di agonisti recettoriali diretti. 5-HT, 5-idrossitriptamina; IMAO, inibitori delle monoamino-ossidasi.

Farmaci in uso in Italia associati alla sindrome serotoninergica

Classe farmacologica	Principio attivo
Antidepressivi (inibitori selettivi del <i>reuptake della serotonina</i>)	Sertralina, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram
Antidepressivi (triciclici)	Clomipramina, venlafaxina, duloxetina
Antidepressivi (inibitori delle MAO)	Fenelzina
Anticonvulsivanti	Valproato
Analgesici	Meperidina, tramadolo, fentanil, tapentadolo, pentazocina
Antiemetici	Metoclopramide, ondansetron, granisetron
Antiemicranici	Sumatriptan
Antibiotici ed antivirali	Linezolid (tramite inibizione delle MAO); ritonavir (tramite inibizione dell'isoenzima 3A4 del citocromo P450)
Anoressizzanti	Sibutramina
Antitussivi	Destrometorfano
Integratori dietetici/prodotti erboristici	Triptofano, <i>hypericum perforatum</i> (erba di San Giovanni), ginseng
Altro	Litio carbonato

Sindrome serotoninergica

Diaforesi
Ipertermia

Agitazione
Ansia
Confusione

Insonnia
Letargia
Coma

Nausea, vomito, diarrea,
crampi addominali.

Iperiflessia
(maggiore agli AI)

Tachicardia
Aritmie

Iperensione
Instabilità autonoma

Clonie
(maggiori agli AI)

Tremori
Incoordinazione
(maggiori agli AI)

TERAPIA SINDROME SEROTONINERGICA

- Benzodiazepine
- Nitroprussiato e Nitroglicerina
- Adrenalina e fenilefrina
- Esmololo (tachicardia non corretta dalle benzodiazepine)
- Antiepilettici

NB: nessuna efficacia degli antipiretici (la temperatura corporea è determinata dall'attività muscolare)

- Ciproeptadina

- È un antistaminico di prima generazione, che blocca i recettori H1, con azione di antagonismo non specifico per la serotonina.
- La somministrazione di ciproeptadina in pazienti con sindrome serotoninergica sembra in grado di antagonizzare l'eccessiva stimolazione dei recettori 5-HT1A e 5-HT2.
- Posologia:
 - Adulti: La dose iniziale varia da 4 a 8 mg ogni 1-4 ore secondo la necessità fino alla risoluzione dei sintomi o fino ad una dose giornaliera massima di 32 mg. Per la maggior parte dei pazienti occorrono dai 12 ai 16 mg al giorno.
 - Bambini: 0.25 mg/kg/die suddivisi ogni 6 ore fino ad un massimo di 12 mg/die. La sicurezza e l'efficacia nei bambini al di sotto dei due anni di età non è stata stabilita.

Trattamento intramuscolo o endovenoso nelle urgenze comportamentali

Trattamento im/ev	Dose iniziale mg	Picco	Intervallo fra due somministrazioni
Lorazepam	2	60-90 min	Ev: 5-15 min- Im: 30-60 min
Delorazepam	2	30-60 min	Ev: 30 min Im: 1-2 h
Diazepam	5-10	Ev: 8 min Im: 30-90 min	Ev: ogni 10 min
Midazolam	5-10	15-45 min	Ev: 5-10 min
Aloperidolo	5	20-30 min	1-8 h

CASO CLINICO

1. Contenzione verbale e relazione Inefficace
2. Contenzione fisica (pz aggressiva)
3. Sedazione e consulenza psichiatrica
4. Esame fisico e strumentale
5. Monitoraggio e Vigilanza
6. Rivalutazione

Agli esami di laboratorio si evidenzia positività solo ai cannabinoidi. Lo stato psicopatologico che al momento si rileva, indipendentemente dalla causa, mostra forte agitazione psicomotoria, nonostante le cure e l'osservazione intraprese finora, un pensiero disorganizzato, umore disforico. Necessita di ulteriore osservazione in ospedale, ma non lo accetta, pertanto si conferma il TSO e si ricovera in SPDC.

Paziente in stato di agitazione psicomotoria. Eloquio concitato e reattivo con tematiche di grandezza. Ideazione al momento disorganizzata. Difficile la valutazione della presenza di un delirio franco e strutturato. Umore fortemente disforico. Al momento afferma di aver assunto sostanze di cui non specifica la tipologia e di cui non si riesce a capirne l'effetto. Da rivedere dopo osservazione e terapia. Si consiglia: tavor 1 fl in 100 cc di soluzione fisiologica.

Esito:

Dopo congrua osservazione e parametri vitali stabili
Ricovero in SPDC con diagnosi di
Agitazione psicomotoria di ndd

CONCLUSIONE CASO CLINICO

- A circa 24 ore dal ricovero, pur permanendo dissociazione ideativa con falsi riconoscimenti ed elaborazioni fantastiche della realtà, la paziente riferisce assunzione di Ketamina ed altre sostanze alla paziente non note.
- TERAPIA INTOSSICAZIONE DA KETAMINA
 - Benzodiazepine
 - Terapia di supporto
 - Monitoraggio e osservazione

1. Cercare un colloquio con il paziente
2. Ipotizzare uso di NPS se esami di I livello negativi e non storia psichiatrica (contattare CAV di Pavia)
3. Non necessaria una diagnosi definitiva per il trattamento più idoneo
4. Collaborazione con altri specialisti e definizione percorso del paziente dopo il trattamento in Pronto Soccorso.