I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

XIII congresso nazionale

SIMEU

GENOVA 30 MAG - 1 GIU 2024

L'emostasi nelle ferite - Luisa Borella

Direttore UOC Accettazione e Pronto Soccorso OC San Martino BELLUNO

Emostasi nelle ferite

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

**INSIEME DEI PROCESSI CHE PERMETTONO DI
ARRESTARE IL SANGUINAMENTO**

NELLE

SOLUZIONI DI CONTINUO DEI TESSUTI

Dipende . .

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

AI

AI

AI

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

AI

AI

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

AI

AI

AI

Dipende . .

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

AI

AI

AI

I.MEU
RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

**Emostasi
nel
trauma
maggiore**

**Emostasi
nel
trauma
minore**

Fasi dell'emostasi

- lesione endoteliale e formazione del tappo piastrinico (**FASE VASCOLARE**)
- CASCATA della coagulazione e formazione del coagulo (**FASE PIASTRINICA O EMOSTASI PRIMARIA**)
- interruzione del processo per meccanismi di controllo antitrombotici (**FASE COAGULATIVA O EMOSTASI SECONDARIA**)
- fibrinolisi (**FASE DELLA DISSOLUZIONE DEL**

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Ciò che vorrei sapere per sempre e che spero nessuno mi chieda mai

Qualche dato

- il trauma è l'**8%** delle morti ogni anno nel mondo
- l'*emorragia incontrollata da trauma* è la **prima causa di morte prevenibile in America 1 - 46 anni**
- circa **1/3** dei pz con trauma grave arriva in ospedale con una **coagulopatia** in atto
- ferite: 6 milioni negli Stati Uniti

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

STEP 1

riconoscimento delle condizioni di compromissione in atto o potenziale delle funzioni vitali
-> *STOP THE BLEEDING (<C> ABCDE)*

VEDERE!

FAVORIRE LA MIGLIOR GUARIGIONE

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Stop the bleeding

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Riconoscere e trattare **condizioni immediatamente pericolose**
- Controllo precoce del sanguinamento
- Mantenere la **perfusione d'organo** (ripristino volemia - ossigenazione)
- **Triade letale:** ipotermia - acidosi - coagulopatia

Stop the bleeding

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- **Emorragie esterne:** amputazioni, lacerazioni (cuoio capelluto), contusioni, fratture -> siti comprimibili
- **Emorragie interne:** torace, addome, retroperitoneo -> siti non comprimibili
- **Fratture, fratture di bacino**

Stop the bleeding

- **Pressione diretta** (Gr IB)
- **Medicazione compressiva** (Gr IB)
- **Laccio emostatico (tourniquet)** (Gr IB)
- **Cintura pelvica** (Gr IC)
- **E-FAST preH** (Gr 2B)
- **REBOA** (*resuscitative endovascular balloon occlusion*

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Stop the bleeding

- **Trasporto rapido ed appropriato (Gr IB)**

nel trauma penetrante è dimostrato che per ogni minuto ulteriore nel tempo di arrivo del soccorso la mortalità aumenta del 2%

e per ogni minuto in più sulla scena dell'1%

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Acido Tranexamico

- **Grado I A**
- Agente antifibrinolitico da somministrare il prima possibile
- nel pre H, **entro le 3 ore** dal trauma
- 1 g in 10'
- 1 g nelle successive 8 ore

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Damage control strategy

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

DAMAGE CONTROL RESUSCITATION

- **fermare emorragie esterne**
- mantenimento **perfusione d'organo** (cristalloidi a target pressorio; *nora e dobutamina Gr IC*)
- prevenzione **coagulopatia** (ipotermia - ipoperfusione - acidosi metabolica)
- infusioni calde, sangue 0 -
- **trasfusione massiva** 1:1:1 TEG guidata **Goal-directed therapy** (Gr IB) (Protocollo ECS)
- **reverse therapy** (rischio protrombotico)

TIC (Trauma Induced Coagulopathy)

Genesi multifattoriale

- danno tissutale
- ipoperfusione (ipossia)
- consumo fattori coagulazione
- emodiluizione
- ipotermia
- acidosi
- iperfibrinolisi
- uso di farmaci anticoagulanti/antiaggreganti

Monitoraggio

Sanguinamento (Gr IB)

- NO Hb/Hct seriati
- SI lattati (o deficit basi)

Emostasi (Gr IC)

- PT (INR) (> 1.2 - > 1.5)
- Fibrinogeno
- Piastrine

*essenziale definire tipo e grado di
coagulopatia (Gr IB)*

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Trasfusione massiva

Emotorace e/o emomediastino

Emorragia addominale e/o retroperitoneale e/o pelvica

Rottura di aneurisma

Emorragia da VE

Emorragia con persistente instabilità emodinamica e/o sanguinamento attivo -> protocollo

Damage control strategy

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

DAMAGE CONTROL RADIOLOGY

- E-FAST
- RX TORACE - BACINO
- ANGIOGRAFIA - EMBOLIZZAZIONE

Damage control strategy

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

DAMAGE CONTROL SURGERY (Gr IB)

- toracica
- addominale
- ortopedica
- spinale
- cranica

STEP 1

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Quanto è grave l'emorragia (pericolosa per la vita) e dove è? C'è sanguinamento attivo?
- Che farmaci assume il pz? Quando ultima dose? C'è il rischio di sovradosaggio?
- Malattie renali od epatiche? Diatesi emorragica?
- Perché assume l'anticoagulante e quanto grande è il rischio di trombosi?

STEP 2

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Quanto è grave l'emorragia e dove è? C'è sanguinamento attivo?
- **Che farmaci assume il pz? Quando ha assunto l'ultima dose? C'è rischio di sovradosaggio?**
- **Perché assume l'anticoagulante e quanto grande è il rischio di trombosi?**
- Malattie renali od epatiche? Diatesi emorragica?

Reverse

Emorragia intracranica o spinale

Emotorace e/o emomediastino

Emorragia addominale e/o retroperitoneale e/o pelvica

Rottura di aneurisma

Emorragia da VE

Emorragia con persistente instabilità emodinamica e/o sanguinamento attivo

XIII congresso nazionale

SIMEU

GENOVA 30 MAG - 1 GIU 2024

DOAC

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Nel pz con funzione renale normale è completamente risolta dopo 5 emivite dall'ultima dose:

- Dabigatran 12 - 17 ore -> 2,5 - 3,5 giorni
- Rivaroxaban 5 - 9 ore -> 1 - 2 giorni
- Apixaban 8 - 15 ore -> 1,5 - 3 giorni
- Edoxaban 6 - 11 ore -> 1,3 - 2 giorni

DOAC

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Osservazione
- Rimozione del farmaco (carbone attivo per ingestione recente e/o emodialisi)
- Agente antifibrinolitico
- Fattori della coagulazione
- Antidoti specifici (reverse)

mancano evidenze da studi randomizzati -> esperienza

Reverse

CCP 20 U/kg + vit. K (1 fl) in 15-20' ->
aggiustamento dose con INR

CCP 25 U/kg + vit. K (1 fl) in 15-20'
CCP 35 U/kg + vit. K (1 fl) in 15-20'
CCP 50 U/kg + vit. K (1 fl) in 15-20'

	<p>CCP 20 U/kg + vit. K (1 fl) in 15-20' -> aggiustamento dose con INR</p> <p>CCP 25 U/kg + vit. K (1 fl) in 15-20' CCP 35 U/kg + vit. K (1 fl) in 15-20' CCP 50 U/kg + vit. K (1 fl) in 15-20'</p>

STEP 3

riconoscimento delle condizioni di compromissione in atto o potenziale delle funzioni vitali
-> *STOP THE BLEEDING*

VEDERE !

FAVORIRE LA MIGLIOR GUARIGIONE

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Le 8 tappe

Emostasi

(Anamnesi) Esame obiettivo

Pulizia

Anestesia

Esplorazione della ferita

Irrigazione

Decisione sulla eventuale sintesi

Consigli per le medicazioni e
discussione sulle aspettative

XIII congresso nazionale

SIMEU

GENOVA 30 MAG - 1 GIU 2024

Emostasi

=

Vedere

=

Capire

The background features a collage of medical and technological icons. On the left, there is a logo for 'I.MEU' with the tagline 'RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE'. Various icons include gears, a globe with 'AI', a padlock, a brain with circuitry, a bar chart, a speech bubble, a mail icon, and a person's silhouette. The overall color palette is dominated by blues, greens, and purples.

I.MEU
RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

COME

- **Compressione locale per 10 - 15'**
- **Bracciale**, sollevamento dell'arto
- *Compressione sui punti di repere vascolare*
- Anestesia con vasocostrittore
- **Zaffo** o fasciatura ed eventuale revisione in un secondo momento
- Cauterizzazione o legatura del

Valutazione del rischio emorragico

PAZIENTE

TRAUMA

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Anamnesi PAT

PAZIENTE

Patologie

Abitudini/stili di vita

Terapia

“PAT”

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Anamnesi PAT

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Diabete
- Immunodepressione
- Insufficienza renale
- Anemie
- Cirrosi
- Tumori
- Deficit circolatori

Diatesi emorragica

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

danno all'endotelio vascolare (su base infettiva, malattie del connettivo, porpora di Schonlein-Henoch, teleangectasie..)

deficit delle piastrine (aplasia midollare, HIV, PIT porpora immune trombocitopenica, ipersplenismo..)

disturbi della funzione delle piastrine (adesione, aggregazione, secrezione, FANS..)

deficit fattori della coagulazione (carenza vit K, epatopatie, CID, emofilia..)

Diatesi Trombotica

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Ereditaria: mutazione del fatt V di Leiden, mutazione del gene della protrombina, deficit di proteina S, deficit di proteina C, deficit di AT III

Acquisita: SDR AB anti-fosfolipidi, CVC, Tp ormonale e contraccettivi orali, malattie infiammatorie intestinali, immobilizzazione, neoplasie mieloproliferative *trombocitemia essenziale policitemia vera*, SDR nefrosica, obesità, gravidanza, età > 65a, tp antitumorali *tamoxifene talidomide*, emoglobinuria parossistica notturna..)

VIRCHOW: alterazione del flusso sanguigno - danno endoteliale - ipercoagulabilità

Anamnesi PAT

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Alcolismo
- Tabagismo
- Età (pediatrica/senile)
- Malnutrizione (avitaminosi C)
- Obesità

Anamnesi PAT

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Anticoagulanti
- Antiaggreganti
- Chemioterapici
- Cortisonici
- Immunosoppressori

Anamnesi GAT

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

TRAUMA

Grado di contaminazione

Agente/tipologia/superficie

Tempo

“GAT”

Anamnesi GAT

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Ambiente
- Presenza di corpi estranei
- Morsi

Anamnesi GAT

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Meccanismo del trauma
- Tipologia dell'agente lesivo
- Forza
- Direzione
- Estensione delle superfici
- Sede

Anamnesi GAT

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Epoca del trauma
- >3 ore -> accelerazione batterica

Agenti emostatici

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- **AGENTI FISICI:** emostasi su substrato passivo
- **AGENTI BIOLOGICAMENTE ATTIVI:** favoriscono la coagulazione nel sito di sanguinamento

Agenti fisici

a base di cera

AGENTE	FONTE	ASPETTO	NOME COMMERCIALE	RIASSORBIMENTO	REAZIONI AVVERSE	COSTO
Cera d'ossa	Cera d'api	Bastoncino	-	Indefinito	compromissione guarigione ossea	
Ostene (materiale implantare in copolimero solubile)	Copolimeri sintetici di ossidi alcalini	Bastoncino	Ostene	48 ore		

Agenti fisici

matrice secca

AGENTE	FONTE	ASPETTO	NOME COMMERCIALE	RIASSORBIMENTO	REAZIONI AVVERSE	COSTO
Gelatina assorbibile (matrice gelatinosa)	Maiale	Spugna Polvere	Gelfoam, Surgifoam, Gelfilm	4-6 settimane	Infezioni, ascessi o granulomi, fibrosi, rimozione del coagulo	+
Cellulosa ossidata rigenerata	Vegetale	Rete	Surgicel	1-2 settimane	Reazione da CE, infezione, aderenze	+
Collagene microfibrillare	Bovino	Fogli Polvere	Actifoam, Avitene, Instat MCH, Helistat, Helitene	> 8 settimane	Granulomi Allergenico	++
Sfere di polisaccaridi	Sintetico	Polvere	Arista AH	24-48 ore	Iperglicemizzante	+

Agenti fisici

matrice secca

- attivazione PLT
- impalcatura per la formazione del coagulo
- assorbimento acqua
- concentrazione fattori emostatici
- tamponamento dei vasi

caricamento moderato

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Agenti fisici

agenti esterni

AGENTE	FONTE	ASPETTO	NOME COMMERCIALE	RIASSORBIMENTO	REAZIONI AVVERSE	COSTO
Chitosano liofilizzato	Carboidrati complessi biodegradabili derivati dalla chitina	Medicazione adesiva	Bendaggio HemCon (Chitoflex)	-	Formazione necessaria per un corretto utilizzo	
Spugna impregnata di caolino	Minerale alluminosilicato	Garza Tampone	Quikclot	-	Rottura del coagulo alla rimozione	
Hemafiber	Cellulosa e silice	Medicazione tampone fascia elastica	NuStat OTC NuStat Flex N. Trauma	-		+

Agenti fisici

agenti esterni

- uso militare
- in SO controllo vascolare prossimale
- Chitosano: proprietà adesiva che sigilla i vasi (3')
- Caolino: attiva il fatt XII
- Nustat: fibre emostatiche di cellulosa e silice

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Agenti biologicamente attivi

AGENTE	FONTE	ASPETTO	NOME COMMERCIALE	RIASSORBIMENTO	REAZIONI AVVERSE	COSTO
Trombina topica	Bovino	Liquido	Trombina JMT	-	Possibile trombosi se applicazione intravascolare	++
	Umano		Evitromo		Formazione di Ab contro la trombina bovina che possono inibire la coagulazione e allungare INR	++
	Umano ricombinante (rHuman)		Ricognitore			++

Agenti biologicamente attivi

AGENTE	FONTE	ASPETTO	NOME COMMERCIALE	RIASSORBIMENTO	REAZIONI AVVERSE	COSTO
Sigillante di fibrina (Fibrinogeno umano e trombina umana)	Umano	Liquido	Artiss Tissel Evicel TachoSil Evarrest Vistaseal	Immediato	Possibile esposizione a virus trasmissibili per via ematica	+++
	Umano autologo		CryoSeal Fibrina Sigillante System Vitagel (fibrinogeno autologo e trombina bovina)			ND
	Umano	Polvere (Spray ed applicazione diretta + spugna gelatina)	Raplixa	4-6 settimane		ND

Agenti biologicamente attivi

AGENTE	FONTE	ASPETTO	NOME COMMERCIALE	REAZIONI AVVERSE	COSTO
Medicazione sigillante a secco in fibrina (DFSD)	Fibrinogeno e trombina liofilizzati applicati su garza	Medicazione	-		++++
Adesivo tessutale albumina-glutaraldeide bovina	Bovino	Liquido	Biocolla	Formazione di Ab contro la trombina bovina che possono inibire la coagulazione e allungare INR	++++

ACIDO TRANEXAMICO: ha il potenziale di inibire la fibrinolisi locale e ridurre il sanguinamento ma servono ulteriori studi prima di poter essere raccomandato

Preparazioni combinate

AGENTE	FONTE	ASPETTO	NOME COMMERCIALE	RIASSORBIMENTO	REAZIONI AVVERSE	COSTO
Trombina/Gelatina	Bovino o suino	Liquido	Floseal Surgifilo	6-8 settimane	Formazione di Ab contro la trombina bovina che possono inibire la coagulazione e allungare INR	+++
Trombina/Collagene	Bovino		Costasi	4 settimane		

Le 8 tappe

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Emostasi
- (Anamnesi) Esame obiettivo**
- Pulizia**
- Anestesia**
- Esplorazione della ferita**
- Irrigazione**
- Decisione sulla eventuale sintesi**
- Consigli per le medicazioni e discussione sulle aspettative**

Guarigione

Fase di emostasi
(aggregazione - cascata - coagulo)

Fase infiammatoria
(migrazione PMN e monociti)

Fase proliferativa
(fibroblasti - granulazione - angiogenesi)

Fase di maturazione e rimodellamento
(miofibroblasti contrattili)

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Concludendo

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- **Formazione:** implementazione nella pratica clinica delle LG Evidence-Based per il trattamento del sanguinamento nel trauma maggiore (Gr IB)
- **Simulazione:** aderenza alle LG!
- **Debriefing**

Royal London Hospital

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- *Major Trauma Center*

- *2008 - 2017*

trasfusioni massive 68 -> 24%

trasfusione EC 12 -> 4 U

mortalità 45 -> 27%

Ancora...

- POCT - ECO sul territorio
- Comunicazione
- FSE
- App Terapia

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

Allo studio..

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- **Arginina vasopressina:** nello shock emorragico i livelli sono diminuiti e un bolo 4 UI seguito da infusione 0,04 UI/min ha evidenziato una minor necessità di infusioni

- **Autotrasfusione**

Allo studio..

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

- Antidoto **CIRAPARANTAG**: legame diretto agli inibitori della trombina, del fattore Xa e alle eparine invertendo le proprietà anticoagulanti in 10' (edoxaban più lento) senza effetti avversi
- **FXa**: forma mutante del fatt Xa, inattiva, che si attiva col fatt V attivato sulle superfici cellulari danneggiate, ripristinando selettivamente l'emostasi nel sito del sanguinamento

A stylized illustration of a hospital hallway. In the foreground, a patient lies on a gurney, partially covered by a white sheet. A medical professional in a white coat and cap stands by the gurney. In the background, other medical staff in white coats and caps are walking down the hallway. The scene is rendered in a soft, painterly style with a light blue and white color palette.

Nessuno di noi è tanto in gamba
quanto tutti noi messi insieme

Roy Kroc

I.MEU

RUOLO.TALENTO.PASSIONE.IDEE

XIII congresso nazionale

SIMEU

GENOVA 30 MAG - 1 GIU 2024

Grazie

Bibliografia

- Suture in Pronto Soccorso, Ed Med Sc 2014
- www.uptodate.com 2024 (Overview of hemostasis, Overview of topical hemostatic agents and tissue adhesives, Approach to the adult with a suspected bleeding disorder, Control of external hemorrhage in trauma patient, Initial management of moderate to severe hemorrhage in the adult trauma patient, Risks and prevention of bleeding with oral anticoagulants, Management of bleeding in patients receiving direct oral anticoagulants, Heparin and LMW Heparin: dosing and adverse effects, Evaluating adult patients with established venous thromboembolism for acquired and inherited risk factors, Overview of the causes of venous thrombosis..)
- ATLS Tenth Edition 2018
- PHTLS Ninth Edition 2019

Bibliografia

- The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition, Rossain et al. Critical Care 2023
- Nasser AAH, Nederpelt C, El Hechi M, Mendoza A, Saillant N, Fagenholz P, Velmahos G, Kaafarani HMA. Every minute counts: the impact of pre-hospital response time and scene time on mortality of penetrating trauma patients. Am J Surg. 2020;220(1):240-4
- Cole E, Weaver A, Gall L, West A, Nevin D, Tallach R, O'Neill B, Lahiri S, Allard S, Tai N, et al. A decade of damage control resuscitation: new transfusion practice, new survivors, new directions. Ann Surg. 2021;273(6):1215-20
- Cohn SM, McCarthy J, Stewart RM, Jonas RB, Dent DL, Michalek JE. Impact of low-dose vasopressin on trauma outcome: prospective randomised study. World J Surg. 2011;35(2):430-9.