Reversal therapy: 2 anni di esperienza nell'ASLTo5

Laura Perazzolo, Vincenzo Marcone
ASLTo5 (Torino)

La terapia anticoagulante

- Ha cambiato la gestione del cardio tromboembolismo
- Svolta terapeutica dei DOAC
- Una delle principali cause di sanguinamento maggiore (2-5%/anno)

Bleeding in patients on DOAC

Vital signs (RR, HR, BP, mental status), identify the source of the bleeding, check the last intake of DOAC, consider activated charcoal for known recent ingestion, within 2-4 hr

Laboratory test, BGA (base deficit, lactate, blood count cells, coagulation parameters, kidney function), TEG/ROTEM if possible

Surgical, endoscopic, or angiographic hemostasis if the site is accessible

For all patients

Balanced crystalloids and vasopressors, minimize crystalloid infusions (<3 liters in the first 6 hr), maintain haemoglobin >7 g/dl with blood products

Reverse: is the antidotes available?

YES

For dabigatran: administer idarucizumab
for FXa inhibitor (apixaban, betrixaban, edoxaban, and vrioxaban): administer andexanet alfa

NO

Administer either PCC
or aPCC (50 UI/Kg)

Materiali e metodi

- Studio retrospettivo osservazionale
- Maggio 2022-Maggio 2024
- MeCAU ASLTo5

Origine dei dati

- database farmacia territoriale
- archivio elettronico DEA
- cartelle cliniche

Obiettivi

- Aderenza alle linee guida
- Efficacia emostatica di Andexanet
- Mortalità
- Eventi avversi

10 pazienti

Età media 78 aa (62 aa-90 aa)

7 M + 3 F

5 *hub* H. Moncalieri + 5 *spoke* H. Chieri + 0 *spoke* H. Carmagnola

7 pz trattati in DEA, 3 pz trattati in reparto

7 Apixaban 5 mg x 2, 1 Apixaban 2.5 mg x 2, 2 Rivaroxaban 20 mg

M/F	PATOLOGIA	REPARTO	DOAC	DOSE <u>Andexanet</u>
M	Ulcera sanguinante	Rep Medicina	Api 5 mg x 2	BASSA
M	ICH (no NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA
M	Rettorragia	DEA	Api 5 mg x 2	ALTA
F	ICH (si NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA
M	Ernia strozzata	DEA	Api 2.5 mg x 2	BASSA
	ESA (no NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA
	ICH (si NCH)	DEA	Riva 20 mg	BASSA
	Colecistite perforata	Rep Chirurgia	Api 5 mg x 2	BASSA
	Ulcera sanguinante	Rep Medicina	Riva 20 mg	BASSA
	ESA (no NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA

Bleeding in patients on DOAC

Vital signs (RR, HR, BP, mentation),
consider

the last intake of DOAC,
-4 hr

Sanguinamento

- attivo
- pericoloso per la vita
- in sito critico

Laboratory test, BGA (base

eters, kidney function),

Surgical, en

cesible

oppure

Balanced crystalloids and va

n the first 6 hr), maintain

Necessità di

- intervento chirurgico
- procedura invasiva

YES

NO

For dabigatran: administer idarucizumab
for FXa inhibitor (apixaban, betrixaban, edoxaban,
and vrioxaban): administer andexanet alfa

Administer either PCC
or aPCC (50 UI/Kg)

Sanguinamento

- attivo
- pericoloso per la vita
- in sito critico

oppure

Necessità di

- intervento chirurgico
- procedura invasiva

8 pz

2 tratto GEL alto
1 tratto GEL basso
5 sanguinamento SNC

M/F	PATOLOGIA	REPARTO	DOAC	DOSE Andexanet
M	Ulcera sanguinante	Rep Medicina	Api 5 mg x 2	BASSA
M	ICH (no NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA
M	Rettorragia	DEA	Api 5 mg x 2	ALTA
F	ICH (si NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA
M	Ernia strozzata	DEA	Api 2.5 mg x 2	BASSA
F	ESA (no NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA
M	ICH (si NCH)	DEA	Riva 20 mg	BASSA
M	Colecistite perforata	Rep Chirurgia	Api 5 mg x 2	BASSA
M	Ulcera sanguinante	Rep Medicina	Riva 20 mg	BASSA
F	ESA (no NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA

Apixaban 7 pz
Rivaroxaban 2 pz

Sanguinamento

- attivo
- pericoloso per la vita
- in sito critico

oppure

Necessità di

- intervento chirurgico
- procedura invasiva

2 pz

Chirurgia addominale

Aderenza alle linee guida

M/F	PATOLOGIA	REPARTO	DOAC	DOSE Andexanet
M	Ulcera sanguinante	Rep Medicina	Api 5 mg x 2	BASSA
M	ICH (no NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA
M	Rettorragia	DEA	Api 5 mg x 2	ALTA
F	ICH (si NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA
M	Ernia strozzata	DEA	Api 2.5 mg x 2	BASSA
F	ESA (no NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA
M	ICH (si NCH)	DEA	Riva 20 mg	BASSA
M	Colecistite perforata	Rep Chirurgia	Api 5 mg x 2	BASSA
M	Ulcera sanguinante	Rep Medicina	Riva 20 mg	BASSA
F	ESA (no NCH)	DEA	Api 5 mg x 2	BASSA

Apixaban 7 pz
Rivaroxaban 2 pz

- Stabilizzazione dell'emodinamica e dei valori di Hb nel sottogruppo dei pazienti trattati per emorragia digestiva
- Nessun paziente ha necessitato di ulteriori emotrasfusioni dopo il trattamento con Andexanet
- I pazienti trattati per procedure chirurgiche indifferibili non sono incorsi in complicanze emorragiche perioperatorie
- Nei pazienti trattati per ICH/ESA l'efficacia antidotica è meno evidente, con peggioramento radiologico a 6-24 ore in 4 casi su 5

Efficacia emostatica

4 decessi

- A 24-48 h da terapia: 0
- A 1 mese: 1
- A 3 mesi: 1
- A 4 mesi: 1
- A 12 mesi 1
- Intraospedale: 1

Morte

Dopo trattamento con Andexanet

- Nessun evento trombotico né arterioso né venoso
- Nessuna reazione allergica

Eventi avversi

Limiti

Studio retrospettivo

Campione esiguo

1 solo antidoto

Grazie per l'attenzione