Eventi avversi in corso di terapia con inibitori dei check-point immunitari in pazienti oncologici che accedono in pronto soccorso

Jacopo Giamello
Medicina D'Emergenza – Urgenza
AO S. Croce e Carle, Cuneo

XIII congresso nazionale

simeu

GENOVA 30 MAG - 1 GIU 2024

Immune Check Point Inhibitors (ICIs)

Immune Check Point Inhibitors (ICIs)

2011 pazienti oncologici elegibili 1,5%
2019 pazienti oncologici elegibili 40%

Immune Check Point Inhibitors (ICIs)

U.S. FDA APPROVED IMMUNE-CHECKPOINT INHIBITORS

IRAE - Immune Related Adverse Events

Il potenziamento della risposta immunitaria verso antigeni cancerogeni può portare anche ad un incremento della risposta verso autoantigeni, con conseguenti reazioni immunitarie verso i tessuti sani

Immune Check Point Inhibitors (ICIs)

Supportive Care in Cancer

<https://doi.org/10.1007/s00520-022-06844-7>

A nationwide survey among emergency physicians and oncologists to improve the management of immune checkpoint inhibitors toxicity

Jacopo Davide Giamello¹ · Giuseppe Lauria² · Andrea Antonuzzo³ · Paolo Bossi⁴ · Bartolomeo Lorenzati² · Gianmauro Numico⁵

Received: 13 December 2021 / Accepted: 17 January 2022

Immune Check Point Inhibitors (ICIs)

40% non tiene conto del farmaco antineoplastico

20% non considera gli IRAE in un paziente trattato con ICIs

Da 0 a 10, quanto ritieni appropriata la tua conoscenza degli IRAE?

3 [2;5]

IRAE – studio AO Cuneo

Studio retrospettivo 2013-2021

Analisi degli accessi DEA dei pazienti trattati con ICI

Outcome: incidenza di accessi per IRAE

IRAE – studio AO Cuneo

449 pazienti trattati

457 accessi DEA (relativi a 216 pazienti)

età mediana 68 [61;74] anni

neoplasie più frequenti:

- **polmone (42%)**
- **melanoma (20%)**
- **rene-vescica (14%)**

IRAE – studio AO Cuneo

41% codice arancione/giallo/rosso

sintomi di presentazione più frequenti:

- **dolore (25%)**
- **dispnea (14%)**
- **scadimento condizioni generali (12%)**
- **sintomi gastro-intestinali (5%)**
- **febbre (5%)**

Ricovero 55% (di cui 11% di TI/TSI)

Mortalità intra-ospedaliera 19%

IRAE – studio AO Cuneo

IRAE dubbi 15 (3,3%)

IRAE accertati 27 (5,9%):

- **Polmonite: 12 accessi**
- **Colite: 5 accessi**
- **Epatite: 3 accessi**
- **Polimiosite: 3 accessi**
- **Piastrinopenia: 1 accesso**
- **Miastenia: 1 accesso**
- **Polineuropatia: 1 accesso**
- **Scompenso cardiaco: 1 accesso**

IRAE – studio AO Cuneo

**Tempo di insorgenza mediano
tra l'avvio dell'ICI e l'accesso in PS per IRAE
21 [9;50] settimane**

IRAE – studio AO Cuneo

ICIs sempre più indicati e utilizzati, con aumento della sopravvivenza

IRAE sempre più frequenti

Da prendere in considerazione nella diagnosi differenziale

IRAE sono diagnosi di esclusione

Supporto dell'oncologo nella gestione