Emorragia massiva post-traumatica in pronto soccorso: strategie terapeutiche a confronto

Dr.ssa Grisanti Daniela

UO Medicina d'Urgenza e PS
Ospedale NOCSAE – Baggiovara
Azienda USL Modena

Dr. Giovanni Pinelli

Dr. Geminiano Bandiera
UO Medicina d'Urgenza e PS
Ospedale NOCSAE – Baggiovara
Azienda USL Modena

NAPOLI 19/11/2016

Il trauma rappresenta una tra le principali cause di mortalità e morbilità per la popolazione giovane

La sopravvivenza è fortemente condizionata dalla rapidità della diagnosi e dall'attivazione precoce del trattamento adeguato

La maggioranza di questi decessi è dovuta a emorragia incontrollata

L'emorragia nel paziente politraumatizzato agisce attraverso due meccanismi

lesione vascolare con
conseguente shock
emorragico

sanguinamento
secondario
a coagulopatia

Emorragia microvascolare
non localizzata nella sede
del trauma

Trauma-induced coagulopathy (TIC)

Il 25% di tutti i pazienti ricoverati in ospedale dopo un trauma sviluppa una coagulopatia ed in particolare uno stato ipocoagulativo, che aumenta ulteriormente il rischio di sanguinamento

E' un predittore indipendente della necessità di trasfusioni massive e di morte

La genesi della coagulopatia deriva da molti meccanismi indipendenti ma che interagiscono tra loro

GENESI COAGULOPATIA

**Negli ultimi anni le pratiche di rianimazione
del paziente politraumatizzato
sono notevolmente cambiate**

Damage control resuscitation for patients with major trauma

Jan O Jansen,¹ Rhys Thomas,¹ Malcolm A Loudon,² Adam Brooks³

BMJ | 13 JUNE 2009 | VOLUME 338

Damage control resuscitation for patients with major trauma

Jan O Jansen,¹ Rhys Thomas,¹ Malcolm A Loudon,² Adam Brooks³

BMJ | 13 JUNE 2009 | VOLUME 338

Damage Control Resuscitation

```
graph TD; A[Damage Control Resuscitation] --> B[Permissive Hypotension]; A --> C[Hemostatic resuscitation]; A --> D[Damage Control Surgery/IR]; C --- E[Trasfusioni bilanciate e PTM];
```

The diagram illustrates the components of Damage Control Resuscitation. A central red box labeled 'Damage Control Resuscitation' has three arrows pointing down to three dark blue boxes: 'Permissive Hypotension', 'Hemostatic resuscitation', and 'Damage Control Surgery/IR'. Below the 'Hemostatic resuscitation' box, the text 'Trasfusioni bilanciate e PTM' is written.

Permissive Hypotension

Hemostatic resuscitation

Trasfusioni bilanciate
e PTM

Damage Control Surgery/IR

Damage control resuscitation for patients with major trauma

Jan O Jansen,¹ Rhys Thomas,¹ Malcolm A Loudon,² Adam Brooks³

BMJ | 13 JUNE 2009 | VOLUME 338

Damage Control Resuscitation

```
graph TD; A[Damage Control Resuscitation] --> B[Permissive Hypotension]; A --> C[Hemostatic resuscitation]; A --> D[Damage Control Surgery/IR]; B --- E[Target coagulopathy]; C --- E; D --- E;
```

The diagram illustrates the components of Damage Control Resuscitation. At the top is a red box labeled 'Damage Control Resuscitation'. A horizontal line below it branches into three arrows pointing down to three dark blue boxes: 'Permissive Hypotension', 'Hemostatic resuscitation', and 'Damage Control Surgery/IR'. Below these three boxes is a yellow box labeled 'Target coagulopathy', which is connected to each of the three boxes above it by a thin line.

Permissive Hypotension

Hemostatic resuscitation

Damage Control Surgery/IR

Target coagulopathy

ACUTE TRAUMATIC COAGULOPATHY (TIC)

- entità distinta di coagulopatia precoce
- è caratterizzata da un'attivazione rapida e incontrollata del processo di fibrinolisi
- gravata da altissima mortalità (60-80%)
- si affronta solo con somministrazione precoce di antifibrinolitici

CRASH-2 *trial collaborators:*

Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial

The Lancet - June 2010. 6736(10)60835-5

DIAGNOSI COAGULOPATIA

Esami di laboratorio: PT, aPTT, fibrinogeno, piastrine

VANTAGGI:

- Disponibili nella maggior parte degli ospedali
- Sono standardizzati

SVANTAGGI:

- Tempistica eccessiva
- Eseguiti su plasma e non su sangue intero
- Non rilevano la presenza di un'iperfibrinolisi

DIAGNOSI COAGULOPATIA

ROTEM: metodica POCT che studia le caratteristiche viscoelastiche del coagulo

VANTAGGI:

- offrono risultati rapidi (entro 5-10 min)
- possono fornire una misura quantitativa e qualitativa dei singoli componenti del processo emostatico
 - sono in grado di documentare precocemente una iperfibrinolisi
 - vengono eseguiti su sangue intero
- possono essere eseguiti alla temperatura reale del paziente

ROTEM

Tromboelastometria rotazionale

ROTEM

ROTEM

I test viscoelastici permettono di correggere le alterazioni della coagulazione in modo individualizzato e mirato evitando gli effetti collaterali di terapie trasfusionali empiriche

“Goal directed therapy”

TERAPIA COAGULOPATIA

EMODERIVATI E AGENTI FARMACOLOGICI

EMAZIE CONCENTRATE

PLASMA FRESCO
CONGELATO

CONCENTRATI PIASTRINICI

Rapporto 1:1:1

PROMM

PROSPECTIVE OBSERVATIONAL MULTICENTER MASSIVE TRANSFUSION STUDY

PROP:P:R

Prospective Randomized Optimum Platelet and Plasma Ratios

TERAPIA COAGULOPATIA

EMODERIVATI E AGENTI FARMACOLOGICI

FIBRINOGENO

- CALCIO
- COMPLESSI PROTROMBINI CICONCENTRATI
- FATTORE VII RICOMBINANTE (Novoseven)
- DESMOPRESSINA
- ANTITROMBINA III

**PROTOCOLLO
TRASFUSIONI
MASSIVE
INDISPENSABILE IN
OGNI STRUTTURA**

somministrazione precoce di plasma
con elevato rapporto FFP:PRBC

1000 cc plasma=2g fibrinogeno

tempo necessario per rendere
effettivamente disponibile il plasma

le trasfusioni di plasma si associano a
importanti effetti collaterali con un
incremento dei rischi di ARDS, MODS

somministrazione rapida di alte
dosi di fibrinogeno
+
eventuale somministrazione di altri
fattori della coagulazione sotto
forma di PCC

POCT h24

ripristino volêmico deve essere
interamente assicurato da infusione
di cristalloidi

Trauma Update Network

Early Coagulation Support (ECS)

*Nardi et al; Gestione dell'emorragia massiva e della coagulopatia da Trauma: il protocollo Early Coagulation Support (ECS)
-Minerva Anestesiol 2013*

- assicurare il supporto precoce della coagulazione
- riducendo il time-to-treat e garantendo la rapida
- correzione del deficit iniziale di fibrinogeno
- limitare l'utilizzo (inappropriato) di plasma

RESEARCH

Open Access

Management of bleeding and coagulopathy following major trauma: an updated European guideline

Donat R Spahn¹, Bertil Bouillon², Vladimir Cerny^{3,4}, Timothy J Coats⁵, Jacques Duranteau⁶, Enrique Fernández-Mondéjar⁷, Daniela Filipescu⁸, Beverley J Hunt⁹, Radko Komadina¹⁰, Giuseppe Nardi¹¹, Edmund Neugebauer¹², Yves Ozier¹³, Louis Riddez¹⁴, Arthur Schultz¹⁵, Jean-Louis Vincent¹⁶ and Rolf Rossaint^{17*}

Spahn et al. *Critical Care* 2013, **17**:R76

<http://ccforum.com/content/17/2/R76>

Trauma Update Network

Early Coagulation Support (ECS)

*Nardi et al; Gestione dell'emorragia massiva e della coagulopatia da Trauma: il protocollo Early Coagulation Support (ECS)
-Minerva Anestesiol 2013*

- assicurare il supporto precoce della coagulazione
- riducendo il time-to-treat e garantendo la rapida
- correzione del deficit iniziale di fibrinogeno
- limitare l'utilizzo (inappropriato) di plasma

RESEARCH

Open Access

The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition

Rolf Rossaint¹, Bertil Bouillon², Madimir Cerny^{3,4,5,6}, Timothy J. Coats⁷, Jacques Duranteau⁸, Enrique Fernández-Mondéjar⁹, Daniela Filipescu¹⁰, Beverley J. Hunt¹¹, Radko Komadina¹², Giuseppe Nardi¹³, Edmund A. M. Neugebauer¹⁴, Yves Ozier¹⁵, Louis Riddez¹⁶, Arthur Schultz¹⁷, Jean-Louis Vincent¹⁷ and Donat R. Spahn^{19*}

Rossaint et al. *Critical Care* (2016) 20:100
DOI 10.1186/s13054-016-1265-x

IL NOSTRO STUDIO

Obiettivi:

valutazione del valore predittivo di determinate caratteristiche cliniche, esami di laboratorio e test viscoelastici nell'identificare i pazienti maggiormente a rischio di:

- sviluppare una coagulopatia
- ricevere trasfusioni massive
- andare incontro a decesso

ricercare quei parametri che possono permetterci di identificare precocemente quei pazienti che necessitano di un trattamento più aggressivo fin dal loro ingresso nel DEA

IL NOSTRO STUDIO

Studio retrospettivo osservazionale di coorte sui politraumi emorragici valutati al Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense in 20 mesi consecutivi, dal 1 luglio 2014 al 31 marzo 2016

Criteri di inclusione:

- patologia traumatica gravata da sanguinamento
- Injury Severity Score >15
- sottoposti ad analisi coagulative tramite
- test viscoelastici durante la degenza

Sesso

Età

Dinamica

Acido tranexamico

Analisi descrittiva

Trasfusioni Massive

Outcome

Causa del decesso

1° STEP

CORRISPONDENZA GRAVITA' TRAUMA-COAGULOPATIA

ISS- BE-LATTATI

BE e lattati si sono rivelati indicatori precoci di sviluppo di una coagulopatia post-traumatica

Correlazione non statisticamente significativa per ISS

2° STEP

INDICATORI per TRASFUSIONI MASSIVE

L'identificazione precoce dei pazienti a rischio di trasfusioni massive è estremamente difficile

Score Civilian or Military Database Number of patients	TASH [22,28] Civilian 4527		Rainer (PWH) [19] Civilian 1891		Vandromme [21] Civilian 514		ABC [18] Civilian 596		Schreiber [20] Military 558		Larson [29] Military 1124	
Variable	Value	Pts	Value	Pts	Value	Pts	Value	Pts	Value	Pts	Value	Pts
Gender	male	1										
Pelvic fracture (AIS 5 ≥ 5)	clinically unstable	6	displaced (AIS 5 ≥ 4)	1								
Femur fracture (AIS 5 ≥ 3)	open and/or dislocated	3										
Free IF (FAST) (AIS 4 ≥ 3)	present	3	or CT-positive	2			positive	1				
Heart rate (bpm)	> 120	2	≥ 120	1	> 105	1	≥ 120	1			> 110	1
Systolic blood pressure (mmHg)	< 100	4	≤ 90	3	< 110	1	≤ 90	1			< 110	1
	< 120	1										
	< 7	8	≤ 7	10	≤ 11	1			≤ 11	1	< 11	1
	< 9	6	7.1 to 10	1								
Hemoglobin (g/dl)	< 10	4										
	< 11	3										
	< 12	2										
	< -10	4	BD > 5	1							≤ -6	1
Base excess (mmol/L)	< -6	3										
	< -2	1										
Mechanism of injury							penetrating	1	penetrating	1		
INR					> 1.5	1			> 1.5	1		
GCS			≤ 8	1								
Lactate					≥ 5	1						

2° STEP

INDICATORI per TRASFUSIONI MASSIVE

L'identificazione precoce dei pazienti a rischio di trasfusioni massive è estremamente difficile

Criteria ECS:

- Emorragia severa
- PA < 100 mmHg
 - BE < -6
 - Lat > 5,5 mmol
 - Hb < 9 mg/dl

Il BE si è rivelato il dato più affidabile nel guidare l'attivazione di un protocollo trasfusioni massive

Criteri ECS:

Emorragia severa

- PA < 100 mmHg
- BE < -6
- Lat > 5,5 mmol
- Hb < 9 g/dl

Applicando questi criteri alla nostra coorte...

Molto sensibili ma poco specifici!

**Necessità di integrare lo score con parametri
che ne aumentino la specificità**

3° STEP

PREDITTORI OUTCOME

PT, aPTT e fibrinogeno
si sono rivelati anche
predittori di TM

possono aumentare specificità
dello score!

Criteria ECS:

- Emorragia severa
- PA < 100 mmHg
- BE < -6
- Lat > 5,5 mmol
- Hb < 9 mg/dl

+ ROTEM

3° STEP

PREDITTORI OUTCOME

Età, GCS, PT, aPTT e fibrinogeno si sono rilevati buoni predittori di outcome

Insorgenza di coagulopatia = poor outcome!

4° STEP

TROMBOELASTOMETRIA ROTAZIONALE

L'attuale protocollo di gestione del politrauma presso il NOCSAE non prevede l'utilizzo standardizzato dei test viscoelastici nella fase iniziale della gestione del paziente.

I test viscoelastici da noi valutati erano quindi talvolta eseguiti successivamente alla somministrazione di emoderivati ed agenti farmacologici

Pazienti deceduti

■ no cagulopatia ■ sì cagulopatia

Alterazioni coagulative nei pz deceduti

■ Deficit globale severo
■ Deficit fattori
■ Deficit fibrinogeno
■ Deficit piastrine

4° STEP

TROMBOELASTOMETRIA ROTAZIONALE

Abnormal result	Diagnostic hypothesis	Confirmatory test and need to check for	Treatment
Prolonged CT (> 80" in Extem)	<ul style="list-style-type: none"> - Fibrinolysis - Anti Vit K anticoag - Factors deficit 	<ul style="list-style-type: none"> - CT Extem > CT Aptem - Anamnesis/Age - Massive hemodilution? Severe acidosis? 	<ul style="list-style-type: none"> - Tranexamic Ac 1gr - PCC 25 U/kg - Plasma (+ Fibrinogen if A10<7mm)
Reduced A10/MCF (<40mm in Extem)	<ul style="list-style-type: none"> - Fibrinogen deficit - PLT deficit 	<ul style="list-style-type: none"> - A10 Fibtem ≤7mm - A10 Extem <40mm A10 Fibtem >7mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Fibrinogen 2-4g - Platelets
A10 Extem <30mm	- Severe global deficit	- Check for hypothermia	<ul style="list-style-type: none"> - Tranexamic ac 1g + Fibrinogen 4g + Plasma + Platelets
ML increased (>15%)	- Fibrinolysis	- ML>15% in Extem, Intem & Fibtem but not in Aptem	- Tranexamic ac 1g
Prolonged CT after cell-saver reinfusion	- Heparin	- CT Heptem < CT Intem	- Protamin 1000-2000 UI

Confronto con gli esami di laboratorio:

- In due casi ROTEM ha evidenziato ipofibrinogenemia non riscontrata dal laboratorio
- In un paziente ROTEM evidenziava un quadro di deficit globale severo mentre gli esami standard solo ipofibrinogenemia

E' chiara la ripercussione sulle seguenti scelte terapeutiche

CONCLUSIONI

Il nostro studio dimostra come la coagulopatia sia una complicanza tutt'altro che rara del sanguinamento massivo nel paziente politraumatizzato e come essa incida sull'outcome

I traumatizzati gravi con emorragia non controllabile e acidosi metabolica severa (elevati valori di BE e lattati) sono gravati da una maggior probabilità di sviluppare una coagulopatia e quindi da una mortalità molto elevata

Con POCT ho precocemente informazioni su iperfibrinolisi, fibrinogeno e fattori della coagulazione che correlano con mortalità ma che sono anche ottimi predittori di trasfusioni massive

CONCLUSIONI

La gestione di tali pazienti resta difficile e necessita di un approccio multidisciplinare, basato sul damage control

Ogni struttura dovrebbe sviluppare un protocollo di gestione che permetta un approccio standardizzato al problema

Tale approccio andrà integrato con metodiche point-of-care di valutazione dell'emostasi che permettono una "*goal directed therapy*"

Grazie per l'attenzione

Dr.ssa Daniela Grisanti