

LE INSIDIE NEI PAZIENTI CON ABUSO ALCOLICO

GIAMPIERO SPANÒ


Pronto Soccorso Ospedale Buccheri La Ferla FBF – Palermo

Direttore: Dr. Michele Zagra



L'intossicazione alcolica è la conseguenza dell'ingestione di una quantità eccessiva e quindi tossica di alcol in poco tempo.

STATO DI EBBREZZA




UBRIACHEZZA

- ▶ La gravità delle manifestazioni cliniche della intossicazione acuta da alcol è dipendente dalle caratteristiche del soggetto e dalla qualità e quantità degli alcolici assunti.
- ▶ L'etanolo, per la sua liposolubilità, solo dopo pochi minuti dalla assunzione penetra la barriera emato-encefalica .
- ▶ Il tempo necessario per completare il processo di assorbimento dell'alcol varia da 2 a 6 ore, in funzione di fattori quali la presenza di cibo e di altri liquidi, Il tempo impiegato per l'ingestione della bevanda, la variabilità biologica fra individui.


- ▶ L'alcol è prevalentemente metabolizzato attraverso il fegato e in misura minore a livello gastrico.
- ▶ Una piccola quantità viene escreta immodificata dai polmoni, dai reni e dalla cute.

Concentrazione di alcol nei liquidi biologici



Intossicazione alcolica

SINTOMI



- ▶ Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol
- ▶ Per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume.

(Carta europea sull'alcol – Parigi 1995)

- **0,5 g/L** è il limite legale del tasso alcolemico per la guida
- **0 g/L** per i neopatentati (3 anni),
per i minori di 21 anni ,
per gli autisti professionali con mezzi a pieno carico sup. a 35
quintali

Sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica

Concentrazione di alcol nel sangue (g/L)

*Sensazioni più frequenti **

Effetti progressivi e abilità compromesse *

0,1 – 0,2

Iniziale sensazione di ebbrezza
Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo

Affievolimento della vigilanza , attenzione e controllo
Iniziale riduzione del coordinamento motorio
Iniziale riduzione della visione laterale
Nausea

0,3 – 0,4

Sensazione di ebbrezza
Riduzione delle inibizioni , del controllo e della percezione del rischio

Riduzione delle capacità di vigilanza , attenzione e controllo
Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi
Riduzione della visione laterale
Vomito

Sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica

g/L

Sensazioni

Effetti

1.6 – 3.0

Stordimento
Aggressività
Stato depressivo
Apatia
Letargia

Compromissione grave dello stato psicofisico
Comportamenti aggressivi e violenti
Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare
Ipotermia
Vomito

3.1 – 4.0

Stato di incoscienza

Allucinazioni
Cessazione dei riflessi
Incontinenza
Vomito
Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito

Sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica

g/L

Sensazioni

Effetti

1.6 – 3.0

Stordimento
Aggressività
Stato
depressivo
Apatia
Letargia

Compromissione grave dello stato
psicofisico
Comportamenti aggressivi e violenti
Difficoltà marcata a stare in piedi o
camminare
Ipotermia
Vomito

3.1 – 4.0

Stato di
incoscienza

Allucinazioni
Cessazione dei riflessi
Incontinenza
Vomito
Coma con possibilità di morte per
soffocamento da vomito

Sintomi correlati ai livelli di concentrazione alcolemica

g/L

Sensazioni

Effetti

Oltre 4

**Difficoltà di respiro ,
sensazione di soffocamento
Sensazione di morire**

**Battito cardiaco rallentato
Fame d'aria
Coma
Morte per arresto cardiaco**

***A parità di quantità di alcool assunto , sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto , con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.**

0,5 – 0,8 g/l :

- multa da 500 a 2000 E
- Riduzione di 10 punti dalla patente
- Sospensione della patente per min.3 mesi max 6 mesi

0,8 – 1,5 g/l:

- multa da 800 a 3200 E
- riduzione di 10 punti dalla patente
- sospensione della patente da 6 a 12 mesi
- arresto fino a 6 mesi

Oltre 1,5 g/l:


- multa da 1500 a 6000 E
- riduzione di 10 punti della patente
- sospensione della patente da 12 a 24 mesi
 - arresto da 3 a 12 mesi
- sequestro del veicolo (se autista proprietario)

L'accertamento del tasso alcolemico è effettuato dagli organi di polizia , tramite l' etilometro.

La misurazione deve essere effettuata almeno 2 volte, a distanza di 5 minuti, per escludere un malfunzionamento dello strumento.

Il conducente che si rifiuta di effettuare il controllo verrà considerato come conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l.

Quale è il codice di triage appropriato per un pz che arriva in PS «ubriaco» ?



**Domanda : solitamente che codice attribuisce ad un pz.
“ubriaco” ?**

► Intervistati :

❑ 10 operatori (autisti/soccorritori)
del 118

❑ 10 infermieri di triage

Intossicazione alcolica

Triage

Valutazione da parte degli operatori del 118
(autisti/soccorritori)

► Codice 1 : 9

► Codice 2 : 1

► Codice 3 : 0




Infermieri di triage (B.L.F)

- Codice verde : 8
- Codice giallo : 2
- Codice rosso : 0



Quale pensi sia il codice di priorità appropriato per un pz. che giunge al P.S. “ubriaco” ?



▶ Intervistati : 10 medici di
PS

▶ 10 neurologi

Medici

- ▶ Codice verde : 7
- ▶ Codice giallo : 3
- ▶ Codice rosso : 0




Neurologi

Codice verde : 0

Codice giallo : 9

Codice rosso : 1



Criticità nella valutazione del pz. con intossicazione acuta da alcol

Raccolta anamnestica :

- traumi
- uso di stupefacenti
- uso di psicofarmaci

Raccomandazioni

- Fare una ispezione rapida del paziente (capo – torace –addome) alla ricerca di segni di trauma ferite,ematomi, escoriazioni/abrasioni)
 - - Anamnesi
 - - Parametri vitali
 - -Decubito laterale
- -Vigilanza : **obbligo di protezione nei confronti dei pazienti**

Intossicazione alcolica

Triage



► Verde



Giallo



► Rosso



Il “binge drinking”

► **Modalità di consumo alcolico che comporta l’assunzione in un’unica occasione e in un ristretto arco di tempo di quantità di alcol molto elevate.**

I giovani lo praticano soprattutto nei contesti della socializzazione e del divertimento collettivo, spesso bevendo volontariamente fino ad arrivare all’ubriachezza e all’intossicazione alcolica.

I VOSTRI ETILOMETRI NON
FERMERANNO LA NOSTRA SETE





Grazie.

Giampiero Spanò



x congresso nazionale
simeu

NAPOLI 18-20 NOVEMBRE 2016



