Scuola Medica
dell'Azienda
ULSS 20

A VOLTE RITORNANO ...

**L'esperienza di un Pronto Soccorso
nella gestione (integrata) della TBC**

Dr. Andrea Tenci - Dr.ssa Rosa Perna - Coord. Inf. Nicola Leardini

Congresso Nazionale SIMEU – Rimini 20 ottobre 2012

Ospedale G. Fracastoro - S. Bonifacio (VR)

UOC Pronto Soccorso

Direttore Dr. O. Orsi

LA TBC NELL'ULTIMO SECOLO NEI PAESI RICCHI

TBC nel mondo, OMS 2011

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Source: *Global Tuberculosis Control 2011*. WHO, 2011.

© WHO 2011. All rights reserved.

La TBC in alcune Nazioni: Area Baltica

La fotografia dell'incidenza della TBC nell'Area Baltica esemplifica in modo molto chiaro l'importanza delle condizioni socio-economiche e dell'organizzazione sanitaria nel controllo della TBC.

Area Baltica
Anno 2003

Tassi di incidenza
Per 100.000

Denunce di TBC in Italia

1996	5.152
1997	5.176
1998	4.795
1999	4.429
2000	4.759
2001	4.505
2002	3.925
2003	4.234
2006	4.387

Casi di TBC notificati nel Veneto

ANNO	CASI
1999	545
2000	548
2001	527
2002	520
2003	535
2004	535
2005	493
2006	541

Incidenza globale x 100.000 nella Regione Veneto

Incidenza x 100.000 negli autoctoni

Incidenza $\times 100.000$ negli Immigrati

TBC negli Immigrati nella Regione Europea OMS

Map 4: Percentages of notified TB cases of foreign origin among all TB cases, European Region, 2010^a

- ≤ 5
- 5–19
- 20–49
- > 50
- Not included or not reporting

^a Data from UN Administrated Province of Kosovo (in accordance with Security Council Resolution 1244 (1999)) is not included in the figures reported for Serbia

Residenti/Immigrati nel tempo nei Paesi ricchi - Svezia

Reported Tuberculosis Cases in Sweden,
by Country of Origin, 1984 - 1998

Data courtesy: Romanus V. Swedish Institute for Infectious Disease Control, 1997
Swedish Institute for Infectious Disease Control, 2000

TBC nel Veneto, residenti/immigrati nel tempo

A VOLTE RITORNANO ... L'esperienza di un Pronto Soccorso nella gestione (integrata) della TBC

Dr. Andrea Tenci - Dr.ssa Rosa Perna - Coord. Inf. Nicola Leardini
Congresso Nazionale SIMEU – Rimini 20 ottobre 2012

LE ULSS DELLA
REGIONE VENETO

DISTRETTI 1-2-3

(VERONA città)

340.000 abitanti

DISTRETTO 4

(EST veronese - S. Bonifacio)

131.000 abitanti

LO DI GESTIONE

340.000 abitanti

131.000 abitanti

VERONA
(AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
INTEGRATA)

BORGIO TRENTO

SAN BONIFACIO

BORGIO ROMA

SCHEMA PRINCIPALI OSPEDALI DI RIFERIMENTO

San Bonifacio

PROVINCIA DI VERONA

OSPEDALE GIROLAMO FRACASTORO

San Bonifacio (VR) – INIZIO ATTIVITA' 2006

269 posti Letto
(giugno 2012)

DOTAZIONE POSTI LETTO

Cardiologia	9
Chirurgia	15
Geriatrica	48
Medicina	38
Nefrologia	6
Ortopedia	24
Ostetricia-Ginecologia	30
Pediatria	12
Psichiatria	12
Urologia	5
UTI	8
UTIC	6
Gastroenterologia	8
Lungodegenza	42
Neonatologia	4
Oncologia	2

OSPEDALE GIROLAMO FRACASTORO

San Bonifacio (VR)

269 posti Letto

(giugno 2012)

131.000 residenti

$$269/131 = 2,05 !!!$$

**Percentuale di ricoveri sul totale degli accessi al Pronto Soccorso
Ospedale "G. Fracastoro" Az. ULSS 20 - Anno 2009**

FONTE: ULSS 20 - NS APPLICATIVO + RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE 2009-2010

PS S. Bonifacio - La nostra attività

ANNO	2004	2005	2006 (nuovo osp.)	2007	2008	2009	2010	2011
ACCESSI	46905	47401	53442	54439	57598	56716	57264	59931

PS S. Bonifacio - La nostra attività 2011 - accessi totali 59931

	n° CASI
emottisi/emoftoe	38
bronchite	1015
polmonite	474
febbre	728
dolore toracico	991
...	diverse migliaia di casi/anno

PS S. Bonifacio - La nostra attività 2011 - accessi totali 59931

**OGGI: NON IPOTIZZABILE INSERIRE
VALUTAZIONI ANAMNESTICHE "SPECIFICHE"
(CIOE' VOLTE AD EVIDENZIARE ELEMENTI DI SOSPETTO DI TBC)
NELLA GENERALITA' DEGLI ACCESSI**

**PS S. Bonifacio - La nostra attività
2011 - accessi totali 59931**

OGGI:

**AUSPICABILE INVECE “ELEVARE”
NEGLI OPERATORI LA CAPACITA’
DI SOSPETTO “PRECOCE”**

- FORMAZIONE -

INTERCETTARE PRECOCEMENTE CASI A RISCHIO

Distretto 4 - 131.000 abitanti

TBC

~ 9 casi / anno

(7 / 100.000 abitanti)

Distretto 4 - 131.000 abitanti

	2008	2009	2010
CASI CONFERMATI /NOTIFICATI	14/20	8/10	6/13

FONTE: UFFICIO PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE ULSS 20

Distretto 4 - 131.000 abitanti

	2008	2009	2010
CASI CONFERMATI /NOTIFICATI	14/20	8/10	6/13
CASI "INTERCETTATI" DAL NS PS	12/14	6/8	5/6

Distretto 4 - 131.000 abitanti

	2008	2009	2010
CASI CONFERMATI /NOTIFICATI	14/20	8/10	6/13
CASI "INTERCETTATI" DAL NS PS	12/14	6/8	5/6

➤ 80 %!!

**IL P.S. PUO' CONTRIBUIRE NEL "SISTEMA" INTEGRATO
OSPEDALE - TERRITORIO**

↓ RITARDO DIAGNOSTICO

↓ RISCHIO DI TRASMISSIONE

INTERUMANA (OPERATORI / ALTRI PAZIENTI / FAMILIARI)

Alcuni casi ... suggestivi

Caso 1

Caso 1

Maschio nord-Africa

32 anni

Scheda **2008038352**

Allergie -----

Caso Chiuso

Anamnesi

Esame obiettivo

Urgenza visita:

Modelli An

Oss.Temp.

Data	Ora	Anamnesi	Medico
20/08/2008	12:51	PZ HA ESEGUITO RX-TORACE DA ESTERNO COME RICHIESTO DAL CURANTE. IL RADIOLOGO DI TURNO GIUNGEVA IN PS PER ESPORRE IL CASO DI TUBERCOLOSI CON PRESENZA DI CAVERNE. SI UTILIZZAVA UNA STANZA DELL'OBI PER ISOLARE IL PZ	Dott. Castellano Eliana

Data:

20/08/2008

Ora:

12:51

Documentazione clinica:

Si No

Scala dolore:

Sospetto diagnostico:

Dott. Castellano Eliana

Dr TEICI Andrea

Caso 1

già si delineava un “percorso preferenziale”
per il paz. con elevato sospetto di malattia attiva

- bene dialogo tra Radiologia e P.S.
- bene applicazione precoce di misure profilattiche

Caso 2

Caso 2

Maschio Romania

32 anni

numerosi accessi al ns PS

(per altre problematiche,
non sempre ... “urgenti”)

Sintomo guida
dolore emicostato sx da domenica che aumenta con l'inspirio

Cogn. e Nome [redacted] **del 22/01/1975 età 37** **Accesso 8/8**

Scheda 2011000674 **Allergie -----**

Caso Chiuso

Anamnesi | **Esame obiettivo** | **Urgenza visita:** [dropdown] | **Modelli EO**

Data	Ora	Esame obiettivo	Medico
04/01/2011	21:05	Toni cardiaci ritmici e validi con qualche saltuaria extrasistole. Torace normoespanso con crepitii espiratori campo medio polmone sx	Festini Mira Dr. Mara

Parametri Vitali

Data/ora	Freq.Card.	Press. Max.	Press. Min.	Temp. A.	Temp. R.	Ritmo cardiaco	Sat. O2
04/01/2011 21:01:0	80	115	65	37,6			100

Dr

Quadro radiologico sospetto per infezione tubercolare

**Quadro radiologico compatibile con infezione tubercolare
Ricovero in M.I. a Legnago**

Caso 2

- misure di prevenzione tempestive; diagnosi rapida
- conclusione (ricovero in M.I.) non problematica

- il paz. si è presentato spontaneamente in PS (Cure Primarie!)
- ... ns. gestione accessi precedenti ... (abitudine al bypassaggio...)

Caso 3

Caso 3

Maschio indiano 35 anni

Scheda 2008020857

Allergie -----

Caso Chiuso

Anamnesi

Esame obiettivo

Urgenza visita:

Modelli An

Data	Ora	Anamnesi	Medico
06/05/2008	18:04	GIUNGE PRECEDUTO DA TELEFONATA DELLA DRSSA ██████████ CHE GLI AVEVA FATTO FARE UN RX TORACE COME ESTERNO IN DATA ODIERNA	Dr TENCI Andrea

Addensamento a sx con caverna, sospetto elevato di malattia attiva

Note e Prescrizioni

INTERPELLATI TUTTI I REPARTI DI M. INFETTIVE DI VR E
LEGNAGO ,VI, RO: NESSUN POSTO LETTO DA
ISOLAMENTO DISPONIBILE. PRESI ACCORDI PER
TRASFERIMENTO PRESSO OSPEDALE DI ROVERETO
REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE

Ok

Annulla

Modelli

oni

Presc

prest?

ne me

ndrea

Azienda Ulss 20 di Verona
UOC Direzione Medica

PROCEDURA:

GESTIONE DELLA TUBERCOLOSI IN AMBITO OSPEDALIERO

SEZIONE SPECIALE

PERCORSO DEL PAZIENTE CON TBC SOSPETTA O ACCERTATA

PRONTO SOCCORSO

PROCEDURA DA ATTUARE IN PRONTO SOCCORSO IN CASO DI PAZIENTI CON DIAGNOSI SOSPETTA O ACCERTATA DI TUBERCOLOSI POLMONARE

Focus: Gli utenti inviati al Pronto Soccorso dal MMG o presentatisi di propria iniziativa con sintomatologia verosimilmente ascrivibile ad una forma tubercolare polmonare aperta, devono subito essere invitati ad indossare una mascherina chirurgica e devono sostare nella sala d'attesa per il minor tempo possibile.

SOSPETTO DI TBC INSORTO AL TRIAGE

L'accesso al triage deve essere agevolato per l'utente che presenta un rischio di patologia trasmissibile per via aerea: infatti, la permanenza prolungata del soggetto in un'area affollata può determinare la possibile esposizione al rischio di trasmissione per l'utenza che sosta in tale area.

L'infermiere addetto al triage rappresenta, generalmente, l'operatore che per primo entra in relazione con l'utente che si rivolge al Pronto Soccorso. Questo momento è decisivo per identificare se il soggetto presenta un problema di salute connesso ad un rischio di trasmissione di malattia tubercolare. Per poter effettuare una corretta valutazione l'infermiere deve valutare attentamente la sintomatologia del paziente.

**“...devono sostare nella sala d’attesa
per il minor tempo possibile...”**

“fare indossare al paziente una mascherina di tipo chirurgico che copra bocca e naso”

**“indossare protezione respiratoria efficace,
rappresentata dal facciale filtrante FFP2...”**

I trattamenti sanitari obbligatori coatti in cui l'obbligo di legge può essere imposto in maniera coattiva comprendono:

Le malattie infettive e diffusive (in base all'art. 253 TU delle leggi sanitarie, n 1265/1934 e DM 5/7/1975) per le quali esista l'obbligo di notifica, di visite preventive, di vaccinazione a scopo profilattico, di cura attuata mediante l'isolamento domiciliare, di ricovero in reparti ospedalieri etc.;

... malattie veneree in fase contagiosa

... malattie mentali (omissis) ...

Caso 4

Caso 4

Femmina India 33 anni

2 accessi al P.S.:

marzo

dicembre

Caso 4

accesso mese di marzo

Parametri Vitali

Attività in PS

Sintomo guida

Inviata dal dott. [redacted] per algia base polm. dx in sosp. frattura costale-dispnea(madre in allattamento)

Dati Ac

Inviato c

Autopres

Onere P

Non Valc

118

CO

cod.PZ:45555

Caso 4 (accesso di marzo)

frattura 6[^] e 7[^] costa di dx

dimessa con terapia sintomatica (fans)

Spedale San Bonifacio

Caso 4

accesso mese di dicembre

Sintomo guida

INVIATA DAL DOTT. I PER
NEOFORMAZIONE LATEROCERVICALE IN SOSP.
TBC

Aut

One

Non

11

CO

ifacio

Lesione aperta apice polmonare dx

ARINDER, P87 Cod. Esame
78 F 190

Caso 4

accesso mese di dicembre
ricovero M.I. VR

San Bonifacio, P114 D
L-600 kw.120 mas2
ARINDER, P87 Cod. Esame

Caso

😊

😐

si in P.S.

vi
stica)

co!!

TAKE HOME MESSAGES

FORMAZIONE

CAPACITA' DI SOSPETTO PRECOCE

CAPACITA' ANAMNESTICHE

OPPORTUNITA' DI "INTERCETTAZIONE" (ANCHE CASUALE)

MISURARSI CON LA REALTA' DELLE BARRIERE LINGUISTICHE

**CAPACITA' DI COMUNICAZIONE TRA TERRITORIO E OSPEDALE,
TRA SERVIZI OSPEDALIERI, TRA OSPEDALE E ALTRI OSPEDALI**

Scuola Medica
dell'Azienda
ULSS 20

**Il lavoro, non le chiacchiere,
fa riprendere all'Italia
il suo posto nel mondo**

Grazie per l'attenzione

A VOLTE RITORNANO ...
L'esperienza di un Pronto Soccorso
nella gestione (integrata) della TBC
Dr. Andrea Tenci - Dr.ssa Rosa Perna - Coord. Inf. Nicola Leardini
Congresso Nazionale SIMEU – Rimini 20 ottobre 2012