CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DE

II° CONGRESSO
INTERREGIONALE
SIMEU ABRUZZO
MOLISE

“ITINERARI IN
EMERGENZA
URGENZA”

II° CONGRESSO INTERREGIONALE SIMEU ABRUZZO MOLISE “ITINERARI IN EMERGENZA URGENZA”

CHIETI, 6/7 Maggio 2016

Auditorium del Rettorato
Università “G. d’Annunzio”

URGENZA

EMERGENZA

CRISI

IN
PSICHIATRIA

CHIETI, 6/7 Maggio
2016

Auditorium del
Rettorato
Università “G.
d’Annunzio”

Patrocino richiesto

PRESIDENTE
DEL CONGRESSO
**DOTT.SSA
MARIA DI FELICE**

La Malattia Mentale è una “Emergenza”

Considerazioni preludenti

AUMENTANO LE PERSONE CON DISTURBI PSICHICI. L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ DICHIARA CHE NEL 2020 LA **DEPRESSIONE MAGGIORE UNIPOLARE** SARÀ LA PIÙ DIFFUSA AL MONDO TRA LE MALATTIE MENTALI E IN GENERALE LA SECONDA MALATTIA PIÙ DIFFUSA DOPO LA CARDIOPATIA ISCHEMICA.

Murray CJ, Lopez AD. Lancet. 1997

MEDICINA ORDINARIA: INTERVENTO D'URGENZA PER RISOLVERE/STABILIZZARE PROBLEMA SOMATICO

ASSE D'INTERVENTO PSICHIATRICO: “CONTESTUALE SPOSTAMENTO CENTRIFUGO”.

“LA SITUAZIONE ACUTA, CONSENTENDO LA SODDISFAZIONE DI BISOGNI REGRESSIVI COSÌ IMMEDIATI, CHE DIFFICILMENTE RIESCONO AD ESSERE MENTALIZZATI, PUÒ FAVORIRE UNA SORTA DI TOSSICOMANIA DELL'URGENZA”.

De Martis e Vender 1993

L'OPERATORE E' “COSTRETTO” AD AGIRE IMMEDIATAMENTE.

TALVOLTA L'AZIONE TERAPEUTICA PIU' EFFICACE PUO' ESSERE L'ATTESA.

CRISI

*Ostacolo verso importanti
obiettivi della vita.....*

Caplan, 1961

CRISI MATURATIVE:

Sovvertimento
cognitivo/affettivo

CRISI FORTUITE:

Periodi di sconvolgimento
psicologico da eventi di
perdita significativi

VALORE SOGLIA INTERESSE PSICHIATRICO

- ✓ Sofferenza psichica
- ✓ Pericolosità Sociale
- ✓ Crisi relazioni familiari

RISCHIO IN PSICHIATRIA Fattori Psicopatogenetici

Scatenanti

- Affettivi
- Economici

- Culturali

Favorenti

- Emarginazione
- Età
- Emigrazione

- Processi maturativi
- Cambiamenti
- Eventi stressanti

EMERGENZA IN PSICHIATRIA

MODELLO MEDICO

Minaccia Integrità Biologica
e/o vita stessa del paziente

Taluni autori (F.Asioli)
Emergenza ≠ Urgenza: Pura
disquisizione accademica

EMERGERE ↔ **USCIR FUORI**

Figlio di “*MERGERE*”: Star dentro
Radice linguistica “*MEZG*”

EMERGENZA

**“Situazione che richiede pronta
attenzione. Possibilità rinvio
intervento. Elemento “*emergente*”
ruolo secondario e non affrontabile”**

URGENZA

Situazione richiedente subitaneo intervento

Intervento terapeutico “**RAPIDO**”

(Inclusività concetto di **ACUZIE**)

URGENZA IN MEDICINA

**Insorgenza improvvisa
sintomatologia GRAVE: infarto,
ictus cerebrale, ulcera perforata**

Richiede intervento immediato,
per evitare conseguenze più gravi
o, come spesso accade, per
mantenere in vita il soggetto

Interventi immediati e complessi
Ricovero in ambiente
specializzato: Unità coronarica,
rianimazione, chirurgia,...

Esiste tendenziale accordo, fra
curante, familiari e pazienti (se
coscienti), sul da farsi

URGENZA IN PSICHIATRIA

**Urgenza non improvvisa, ma
progressiva, ingravescente**

L'intervento “non serve” a
mantenere in vita il soggetto

La necessità di ricorrere al
ricovero non è sempre presente

L'accordo sul “che fare” non
sempre esiste

URGENZE

CLASSIFICAZIONE

URGENZE CHE NECESSITANO DI RISPOSTA PSICHIATRICA

(Farmacologica, Contenimento, Ricovero). Quadro propriamente psicopatologico: D. affettivi, depressivi e maniacali, disturbi d'ansia, scompensi deliranti. Sono ad eziopatogenesi funzionale endogena. Vi rientrano le reazioni psichiche abnormi ad eventi esterni (lutti, violenze, separazioni, arresti)

URGENZE CHE NECESSITANO DI RISPOSTA SOMATICA

Sintomatologia somatica richiedente intervento immediato, anche se presente psicopatologia (Scompensi nell'alcolismo: delirium tremens); Intossicazione volontaria da farmaci; Lesioni auto-provocate a scopo suicidario

URGENZE CHE NECESSITANO DI RISPOSTA SOCIO-AMBIENTALE E/O ASSISTENZIALE

- Condizioni cliniche che necessitano intervento rapido ma con risposte "sociali" più che mediche. Bisogni della quotidianità (cibo, igiene, alloggio). Relazioni familiari e sociali critiche. Coinvolgimento psichiatra (sintomi psichici – collegamento fra istituzione sanitaria, sociale e famiglia)

URGENZE CHE NECESSITANO DI RISPOSTE "GIUDIZIARIE"

- Legate all'espressione di comportamenti violenti. Richiesta "impropria" di intervento psichiatrico. Comportamenti affrontati e contenuti dalle forze dell'ordine
- Intervento psichiatrico (crisi dopo intervento polizia)
- Intervento psichiatrico (perizie post-atti delittuosi)

URGENZE IN PSICHIATRIA

LIVELLI DI INTERVENTO

MINORE

Colloquiale
Farmacologico

MAGGIORE

T.S.O.

Proposta + Convalida

48 h da convalida

Ordinanza del Sindaco

In caso di irreperibilità, scadute le 48 h, l'ordinanza decade

Esecuzione ricovero

7 giorni

48 h

Giudice tutelare

Fine del ricovero

Convalida

(Salvo richiesta proroga del Responsabile SPDC)

Mancata Convalida

(Decadenza Immediata)

Gianfranco Tamagnini

URGENZA PSICHIATRICA

CARATTERISTICHE

Patologie psichiatriche rappresentano quadri clinici a lento sviluppo temporale

Fra l'insorgenza dei sintomi e la loro "esplosione" acuta non è stato praticato alcun intervento o interventi inadeguati (stigma, scarsa compliance)

Non è sempre la gravità del disturbo a determinare la necessità dell'intervento urgente
(Rapporto con l'ambiente)

L'importanza di un trattamento rapido non deve indurre a risposte a corto circuito

TRIAGE NEL PAZIENTE PSICHIATRICO

- Alterazione di uno o più parametri vitali
- Paziente con violenza auto e/o etero diretta
- Etilismo acuto non controllabile
- Psicosi acuta (delirium, allucinazioni, grave agitazione psicomotoria, Gravi turbe affettive e/o ideative) **NON controllabili** dall'eventuale accompagnatore

SI

CODICE

NO

- Psicosi acuta (delirium, allucinazioni, grave agitazione psicomotoria, Gravi turbe affettive e/o ideative) **Controllabile dall'eventuale accompagnatore**
- Fobie o Panico **Non Controllabili** dall'eventuale accompagnatore

SI

CODICE

NO

- Fobie o Panico **Controllabile** dall'eventuale accompagnatore
- Patologia lieve non in rapporto con la malattia psichica di base, che è in fase di quiescenza

SI

CODICE

CASI EMBLEMATICI URGENZA PSICHIATRICA

DISTURBO UMORE MONOPOLARE: CRISI
DEPRESSIVA

DISTURBO UMORE BIPOLARE: MANIACALITA'

STATO PSICOTICO ACUTO CON PRESENZA DI
DELIRIO

DISTURBI DI PERSONALITA' OVE SUSSISTONO
ALTERAZIONI COMPORTAMENTALI "IMPORTANTI"

ABUSO DI *S.O.S.*TANZE: INTOSSICAZIONE ACUTA

SINTESI CAPACITA' RICHIESTE ALL'OPERATORE PSICHIATRICO

COMUNICAZIONE EMPATICA E
RELAZIONALE

RICOSTRUZIONE DELLA STORIA E DI
RAGIONAMENTO CLINICO

GESTIONE FARMACOLOGICA

ANCORA SULLE CAPACITA' DELL'OPERATORE

SDRAMMATIZZARE

Tranquillizzare le persone che si sentono minacciate

Trasmettere disponibilità all'ascolto ed alla comprensione

Gli altri operatori presenti vanno coinvolti o allontanati

Vicini o curiosi coinvolti o allontanati

Evitare il rifiuto immediato del ricovero

Utilizzare un linguaggio semplice, chiaro, accessibile e "non ambiguo"

Evitare commenti diretti sulle "convinzioni" del paziente e sui suoi comportamenti bizzarri

Creare atmosfera di rispetto per la condizione di sofferenza del paziente e di partecipazione attenta ai problemi presentati

ASSUMERSI LA RESPONSABILITA'

Manifestare sicurezza nelle decisioni, pieno controllo della situazione

Evitare inganni o sotterfugi circa il proprio ruolo e le finalità dell'intervento

Non stigmatizzare la richiesta di ricovero

Assumersi inizialmente tutta la delega allevia l'angoscia dei familiari coinvolti

Allontanare i presenti coinvolti sul piano emotivo

Evitare ogni collusione coi familiari o altri accompagnatori

Non assumere atteggiamenti moralistici o punitivi verso il paziente o i familiari

Accettare che sia il paziente a stabilire di cosa parlare, cercando di portare poi il discorso sulla crisi attuale

FARMACI ED URGENZE

- ❖ *Se si escludono le **BDZ** che, a dosaggi opportuni hanno effetti relativamente pronti (15-30').*
- ❖ *Gli altri farmaci disponibili (i **NEUROLETTICI**) necessitano di tempi ancora più lunghi per fornire effetti terapeutici.*
- ❖ *Gli **ANTIDEPRESSIVI** non hanno effetti prima di 15-20 giorni, anche se somministrati e.v.*

F. Asoli

SFIDE PRINCIPALI URGENZE COMPORTAMENTALI

AUTO-DIREZIONALITA
SUICIDIO

COMPORTAMENTI
AGGRESSIVI
ETERO-DIRETTI

URGENZE COMPORTAMENTALI

AUTO-DIREZIONALITA'

SUICIDIO	800.000/Anno/Mondo 1/40 Secondi (O.M.S.) >Maschi (3/1) O.M.S. 2014	Ogni caso di morte che risulti direttamente o indirettamente da un atto compiuto dalla vittima stessa, consapevole di produrre questo risultato
SUICIDIO DIMOSTRATIVO	>Donne (4/1)	I mezzi utilizzati e gli atti compiuti non erano idonei a procurare la morte, il paziente ha richiesto aiuto e sapeva che sarebbe stato soccorso. Il gesto ha significato di richiesta, di attenzione, di vantaggi secondari, di intenzioni rivendicative o intenti punitivi verso gli altri
SUICIDIO MANCATO	Tentativo di suicidio che idealmente non è riuscito, nonostante i mezzi e gli atti fossero idonei	
PARASUICIDIO	Atto ad esito non fatale ove si inizia un comportamento non abituale che, senza l'intervento esterno, causerà autolesione, oppure ingerisce sostanze a dosi non terapeutiche.	
IDEAZIONE SUICIDARIA	L'individuo sperimenta l'idea di auto sopprimersi, pur con gradi molto diversi di elaborazione ed intensità, senza arrivare alla messa in atto.	

RISCHIO SUICIDARIO

FATTORI DI RISCHIO

- Precedenti gesti auto lesivi (rischio 5-6 volte superiore, soprattutto nei 3 mesi successivi al precedente tentativo)
- Recente dimissione da un reparto psichiatrico
- Tratti di personalità di tipo impulsivo
- Anamnesi familiare positiva per suicidio, storia di precoci perdite familiari o di violenza in famiglia
- Sesso maschile
- Eventi stressanti precedenti (recente lutto, problemi finanziari, legali o affettivo/sentimentali, notizia di malattia grave o cronica)
- Disoccupazione
- Basso livello sociale
- Isolamento sociale (vedovi, separati, divorziati, single)
- Comportamenti suicidi nell'ambiente (Aspetti emulativi)
- Facile accesso a potenziali mezzi auto lesivi
- Malattie somatiche con marcata componente algica

INTERVENTI

- Trattenere ogni paziente potenzialmente a rischio
- Implicazioni medico-legali (valutazioni e decisioni ben documentate)
- Decisione non facile e NON DELEGABILE
- Se non si è certi della valutazione del rischio, ricoverare il paziente in O.B.I.P.
- Utile coinvolgere i familiari nella decisione
- Ospedalizzazione: Valutazione vantaggi e svantaggi della degenza
- Relatività importanza intervento farmacologico (latenza azione antidepressivi)

COMPORTAMENTI AGGRESSIVI
ETERO-DIRETTI
SCHIZOFRENIA

- Delirio di persecuzione ed influenzamento
- Interpretazione delirante dell'ambiente
- Reazione alla presunta imposizione esterna nell'agire, nel pensare, nel sentire
- Reazione ad allucinazioni uditive
- Reazione alla vicinanza fastidiosa, molesta e limitativa delle altre persone
- **Sintomatologia "positiva" (...Etero-Aggressività)**
- Superamento Sintomatologia "positiva" (...Auto-Aggressività)

- ***Pensiero Paleologico***

TRATTAMENTO PAZIENTE “*VIOLENTO*” IN SITUAZIONI DI URGENZA

URGENZA
COMPORTAMENTALE

- Caratteristiche fisiche ambiente ove svolgere colloquio.
- Sicurezza Paziente ed Operatori
- Paziente aggressivo mai lasciato solo
- Risvolti antropologici

3 Fasi: 1. IRREQUIETEZZA

3. AGGRESSIONE

Il ciclo dell'aggressione

Fase
fattore
scatenante

Fase della
escalation

2. ACCENTUAZIONE

Fase
della
crisi

Fase del
recupero

Possibili
nuovi fattori
scatenanti

fase della
depressione
postr-critica

comportamento di base

modificata da *Maier GJ et al. (2)*

AROUSAL - DE-ESCALATION

1. Prestare attenzione ai primi segni; evitare ingravescenza sintomatologia. Scoprire "Trigger"; enfatizzare "autoanalisi paziente"
2. Alternative gestione ansia: luogo meno stimolante. Paziente "stato-dipendente".
3. Farmacoterapia....Investimento simbolico...
4. Aiutarlo esprimere percezioni. No assecondamento (psicologia comportamentale)
5. Stabilire "limiti comportamentali" (confini) – No posizione vittimologica
6. Ultimo atto prima fase: Allontanare astanti

1. Scostamento linea basale P.E. marcato: interventi tempestivi – No indifferenza. "de-escalation". Deviare percorso comportamentale (Es. Borderline – stato dipendente)
2. Comunicazione assertiva (fra aggressiva e passiva) – (direzionalità, specificità, positività)
3. Errori (domande chiuse neutre, domande chiuse suggestive). SI (domande "rinvio")
4. Difficoltà comprensione: Semplificazione (no completa o complessa ma plausibile – cosmo ideologico)
5. PROSEMICA – Comunicazione Analogica ("Guardare" "Sorridere" "Arretrare senza voltarsi" "Abbigliamento congruo operatore") (Aspetto mimico intervistatore, No promesse non rispettabili, no paternalismi). VARIABILI COMUNICATIVE : Numeriche, Analogiche Paraverbali (Mehrabian). Variabili utilizzo registro prevalentemente verbale.
6. Diade comunicativa e posizione laterale 30°

CUM~TENERE

Gianfranco Tamagnini

ERRORI EMOTIVI E COMPORTAMENTALI CON IL PAZIENTE VIOLENTO ~ (URGENZA COMPORTAMENTALE)

ERRORI “*CONTROTRANSFERALI*” IN SENSO PSICHIATRICO/CRIMINOLOGICO

Errori derivanti da rabbia, frustrazione, suscitati da contatto col
Paziente.

- 1.** Non adeguato alla realtà ritenere di sedare pazienti agitati e pericolosi con le sole parole;
- 2.** Atteggiamento “seduttivo” “sostenendo” le ragioni del paziente;
- 3.** Atteggiamenti “reattivi” (SIMMETRIA);
- 4.** Mostrare “paura” e “ostentazione di sicurezza”;
- 5.** Minimizzare e negare pericolosità del paziente (Errata Razionalizzazione);

COSA DIRE O FARE CON UN PAZIENTE CHE MINACCIA CON UN'ARMA~(URGENZA COMPORTAMENTALE)

TECNICHE COMUNICATIVE DE-ESCALATION

- 1) Sfruttamento del narcisismo (*Del. Megalomanico*);
- 2) Riduzione tensione attraverso il garante (*Perché non utilizzare la presenza di una persona che sia di sua fiducia?*);
- 3) Aggancio emotivo (*dialogo su persone significative – figli, genitori...*);
- 4) Effetto umanizzante della familiarizzazione (*Offrire sigaretta, dividere e consumare del cibo, condivisione esperienze...*); Accomunare sentimenti può rappresentare un freno inibitorio alla violenza indiscriminata;
- 5) Creazione nemico esterno comune (*simmetria – Rinforzo?*); U.S.A.
- 6) Attenzione gratificante a quanto di adeguato è proposto e richiesto dal paziente che minaccia (*Riavere figli, reintegrazione lavoro, riparare ingiustizia subita...*) – *Atteggiamento empatico accettante*;
- 7) Dissociazione fra linguaggio verbale e messaggio emotivo (*Confessione operatore proprio timore per le armi non seguita da “preghiere” – “Riconoscimento supremazia” dell’armato*);
- 8) Rispetto significato di sicurezza dell’arma (*proscritti ordini autoritari e ricattatori di consegnare l’arma, avvicinarsi al paziente armato con gesti eroici inconsulti e minacciosi.*)
- 9) “Ubbidienza uniforme” – *Comportamento uniforme e costante operatori coinvolti. Non Differenziarsi dal gruppo (chi si differenzia dal gruppo, per qualsiasi motivo, che viene aggredito ed ucciso per primo).*

Grazie Per L'ascolto

Titolo: Nursing in area psichiatrica. Il paziente schizofrenico

Autore: Gianfranco Tamagnini

Editore: Alpes Italia

Collana: La sofferenza della mente

Data di Pubblicazione: Marzo 2015

Pagine: XII-164